# Инструкция по применению
# Вильпрафен гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 500 мг/5 мл

## Характеристики




Форма выпуска: Гранулы
Страна: Франция
Производитель: Фамар Хелс Кеа Сервисез Мадрид
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Джозамицин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 500 мг/5 мл

## Описание

Гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь желтые, с запахом клубники, после растворения в воде образуется суспензия желтого цвета с запахом клубники.

## Действующее вещество

Джозамицин

## Состав

Джозамицина пропионат, натрия цитрат - 0.1125 г, метилпарагидроксибензоат - 0.0795 г, пропилпарагидроксибензоат - 0.0105 г, симетикон - 0.075 г, гипролоза - 0.3 г, авицел RC-591[целлюлоза микрокристаллическая, кармеллоза натрия] - 0.6 г, ароматизатор клубничный - 0.05 г, бетакаротен - 0.015 г, сахароза крахмальная порошковая 3% - 10.2005 г, маннитол - 2.25 г.

## Форма выпуска

Гранулы

**Показания**

Лечение инфекционно-воспалительных заболеваний, вызванных чувствительными к джозамицину микроорганизмами: инфекции верхних отделов дыхательных путей и ЛОР-органов (в т.ч. фарингит, тонзиллит, паратонзиллит, средний отит, синусит, ларингит), дифтерия (дополнительно к лечению дифтерийным антитоксином), скарлатина (при повышенной чувствительности к пенициллину), инфекции нижних отделов дыхательных путей (в т.ч. острый бронхит, бронхопневмония, пневмония, включая атипичную форму, коклюш, пситтакоз), инфекции полости рта (в т.ч. гингивит и болезни пародонта), инфекции кожи и мягких тканей (в т.ч. пиодермия, фурункулы, сибирская язва, рожистое воспаление /при повышенной чувствительности к пенициллину/, угри, лимфангит, лимфаденит), инфекции мочевыводящих путей и половых органов (в т.ч. уретрит, простатит, гонорея, при повышенной чувствительности к пенициллину - сифилис, венерическая лимфогранулема), хламидийные, микоплазменные (в т.ч. уреаплазменные) и смешанные инфекции мочевыводящих путей и половых органов.

**Способ применения и дозы**

Способ применения и режим дозирования конкретного препарата зависят от его формы выпуска и других факторов. Оптимальный режим дозирования определяет врач. Следует строго соблюдать соответствие используемой лекарственной формы конкретного препарата показаниям к применению и режиму дозирования.

**Противопоказания**

Тяжелые нарушения функции печени, повышенная чувствительность к эритромицину и другим антибиотикам группы макролидов.

**Побочные действия**

Со стороны пищеварительной системы: редко - отсутствие аппетита, тошнота, изжога, рвота, диарея, псевдомембранозный колит, в отдельных случаях - повышение активности печеночных трансаминаз, нарушение оттока желчи и желтуха. Аллергические реакции: редко - крапивница.Прочие: в отдельных случаях - дозозависимые преходящие нарушения слуха.