
Инструкция по применению
Винилин-ТФФ Бальзам 50 г

Характеристики

Форма выпуска: Бальзам
Страна: Россия
Производитель: Тульская ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Поливинокс
Количество в упаковке: 1



Описание

Бальзам Винилин - густая, вязкая жидкость светло-желтого цвета, специфического запаха. На воздухе не густеет и не высыхает.

Действующее вещество

Поливинокс

Состав

В 1 флаконе содержится: Активное вещество: поливинокс 50 г

Форма выпуска

Бальзам

Фармакокинетика

Не изучалась.

Показания

Наружно: фурункулы, карбункулы, трофические язвы, гнойные раны, мастит, раны мягких тканей, ожоги и обморожения. Внутрь: в комплексном лечении эрозивно-язвенных заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки, обострение хронических гастритов с повышенной секреторной функцией желудка.

Способ применения и дозы

Наружно: для смачивания салфеток и непосредственного нанесения на раневую поверхность в достаточном количестве. Внутрь: 1 раз в день через 5-6 часов после последнего приема пищи (рекомендуется легкий ужин в 18 часов и прием препарата в 23-24 часа). При язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки: 1 чайная ложка в первый день, в последующие дни - по 1 десертной ложке, курс - 16-20 дней. При гастритах с повышенной секреторной функцией: 1 чайная ложка в первый день, далее - по 1 десертной ложке через день, курс - 10-12 дней.

Противопоказания

Гиперчувствительность. При приеме препарата внутрь: заболевания печени, желчного пузыря и почек, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 18 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Возможно применение при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) по показаниям.

Побочные действия

Аллергические реакции.

Взаимодействие с другими препаратами

Взаимодействие препарата с другими лекарствами не изучалось.

Особые указания

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.