Инструкция по применению
Винпоцетин-Акос Таблетки 5 мг 50 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Синтез
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Винпоцетин
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 5 мг
Срок годности: 2

Описание

Церебровазодилатирующее средство

Действующее вещество

Винпоцетин

Состав

винпоцетин 5 мг. Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат - 78.5 мг, целлюлоза микрокристаллическая - 10 мг, повидон К25 - 3 мг, магния стеарат - 1.5 мг, карбоксиметилкрахмал натрия - 2 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

При приеме внутрь быстро абсорбируется из ЖКТ. Cmax в плазме крови достигается приблизительно через 1 ч. При парентеральном введении Vd составляет 5.3 л/кг. T1/2 составляет около 5 ч.

Показания

F07 Расстройства личности и поведения, обусловленные болезнью, повреждением или дисфункцией головного мозга. G45 Преходящие транзиторные церебральные ишемические приступы [атаки] и родственные синдромы. G93.4 Энцефалопатия неуточненная. H31.1 Дегенерация сосудистой оболочки глаза. H35.0 Фоновая ретинопатия и ретинальные сосудистые изменения. H81 Нарушения вестибулярной функции

Способ применения и дозы

Для приема внутрь - по 5-10 мг 3 раза/сут.

Противопоказания

Беременность, повышенная чувствительность к винпоцетину. Для парентерального применения: тяжелая ИБС, тяжелые формы аритмии.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказан к применению при беременности. Данные о безопасности применения в период лактации отсутствуют.

Побочные действия

Со стороны сердечно-сосудистой системы: преходящая артериальная гипертензия, тахикардия, редко - экстрасистолия, увеличение времени возбуждения желудочков.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении с варфарином сообщается о небольшом уменьшении антикоагулянтного действия варфарина. При одновременном парентеральном применении винпоцетина и гепарина возможно повышение риска кровотечений.

Особые указания

С осторожностью применяют внутрь при аритмии, стенокардии, при неустойчивом АД и пониженном сосудистом тонусе. Парентерально, как правило, применяют в острых случаях до улучшения клинической картины, затем переходят на прием внутрь. При хронических заболеваниях винпоцетин принимают внутрь. При геморрагическом церебральном инсульте парентеральное введение винпоцетина допускается только после уменьшения острых явлений (обычно 5-7 дней).

Условия хранения

Беречь от детей, При комнатной температуре