Инструкция по применению
Винпотропил Капсулы 5 мг + 400 мг 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: КАНОНФАРМА ПРОДАКШН
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Винпоцетин+Пирацетам
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 5 мг+400 мг
Срок годности: 36.0

Действующее вещество

Винпоцетин+Пирацетам

Состав

Винпоцетин 5 мг, пирацетам 400 мг. Вспомогательные вещества: лактоза, кальция стеарат.

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

Винпоцетин: После приема препарата внутрь винпоцетин хорошо абсорбируется из ЖКТ, биодоступность составляет около 50-70%. Cmax достигается через 1 ч после приема. Терапевтическая концентрация в плазме крови варьирует от 10 до 20 нг/мл. T1/2 - 4.8 ч. Пирацетам: После приема препарата внутрь хорошо абсорбируется из ЖКТ, биодоступность составляет около 95%. Cmax достигается через 0.5-1 ч после приема внутрь. Проникает через ГЭБ, накапливается в тканях мозга через 1-4 ч после приема внутрь. Из спинномозговой жидкости выводится значительно медленнее, чем из других тканей и жидких сред организма. Практически не биотрансформируется в организме и на 2/3 выводится почками в неизменном виде в течение 30 ч. T1/2 из плазмы составляет 4.5 ч, из головного мозга – 7.7 ч

Показания

Недостаточность мозгового кровообращения (восстановительный период ишемического и геморрагического инсульта, энцефалопатии различного генеза). Паркинсонизм сосудистого генеза. Интоксикации. Травмы головного мозга и другие заболевания цнс, сопровождающиеся снижением интеллектуально-мнестических функций. Психоорганический синдром с преобладанием признаков астении и адинамии. Астенический синдром. Лабиринтопатии, синдром меньера. Профилактика мигрени. Профилактика кинетозов.

Способ применения и дозы

Взрослым и подросткам старше 14 лет препарат назначают по 1-2 капсулы 3 раза/сут. Поддерживающая доза – 1 капсула 3 раза/сут. Длительность курса лечения составляет от 2-3 недель до 2-6 мес. Капсулы следует принимать не разжевывая, перед приемом пищи, запивая достаточным количеством воды.

Противопоказания

Выраженные нарушения ритма сердца.ИБС (тяжелого течения). Острая стадия геморрагического инсульта. Почечная недостаточность. Печеночная недостаточность. Детский возраст до 14 лет. Беременность. Лактация (грудное вскармливание). Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат противопоказан при беременности и в период лактации.

Побочные действия

Со стороны ЦНС психическое и двигательное возбуждение, раздражительность, неуравновешенность, снижение способности к концентрации внимания, тревога, нарушения сна, головокружение, головная боль, экстрапирамидные расстройства.Со стороны пищеварительной системы гастралгии, тошнота, рвота, запор, диарея, снижение аппетита.Со стороны сердечно-сосудистой системы ухудшение течения стенокардии, тахикардия, экстрасистолия, замедление AV-проводимости.Прочие повышение сексуальной активности.Препарат хорошо переносится. Побочное действие отмечается в редких случаях.

Передозировка

Данные о передозировке препарата Винпотропил не предоставлены.

Взаимодействие с другими препаратами

При совместном применении Винпотропил повышает риск геморрагических осложнений гепаринотерапии, усиливает эффекты гормонов щитовидной железы, антипсихотических средств (нейролептиков), непрямых антикоагулянтов. При одновременном применении Винпотропил ослабляет эффект противосудорожных средств (снижает судорожный порог).

Особые указания

Перед отменой препарата дозу Винпотропила следует снижать постепенно.

Условия хранения

В защищенном от солнца помещении