Инструкция по применению
Випросал В Мазь для наружного применения 75 г

Характеристики

Форма выпуска: Мазь
Страна: Эстония
Производитель: Grindex
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Камфора+Салициловая кислота+Скипидар живичный+Яд гадюки
Количество в упаковке: 1



Действующее вещество

Камфора+Салициловая кислота+Скипидар живичный+Яд гадюки

Состав

1 гяд гадюки обыкновенной сухой0.05 МЕДкамфора рацемическая30 мгскипидар живичный30 мгсалициловая кислота10 мг Вспомогательные вещества: вазелин, цетостеариловый спирт, парафин твердый, натрия цетилстеарилсульфат, глицерол, натрия хлорид, вода очищенная - до 1 г.

Форма выпуска

Мазь

Показания

— невралгии,— артралгии,— миозит.

Способ применения и дозы

Применяется наружно у взрослых и детей старше 12 лет.В зависимости от величины кожной поверхности на болезненный участок наносят маленькими порциями 5-10 г (1-2 чайные ложки) мази и втирают в кожу в зависимости от интенсивности боли 1-2 раза /сут до исчезновения болевого синдрома.Продолжительность курса лечения зависит от характера и тяжести заболевания. Пациент должен проконсультироваться с врачом при сохранении симптомов болезни после 14-дневного курса лечения.

Противопоказания

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.— повреждения кожных покровов,— кожные заболевания (в т.ч. аллергического и бактериального генеза),— лихорадочные состояния,— туберкулез легких,— нарушения мозгового и коронарного кровообращения,— склонность к возникновению ангиоспазмов,— тяжелые нарушения функции почек,— тяжелые нарушения функции печени,— общее истощение,— детский возраст до 12 лет,— беременность,— период грудного вскармливания.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Побочные действия

Аллергические реакции: зуд, отек или крапивница.Во избежание побочных явлений рекомендуется предварительно нанести небольшое количество мази на кожу для определения чувствительности к препарату.При появлении побочных эффектов пациент должен проконсультироваться с врачом.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки препарата Випросал В® не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими препаратами

Не описано.

Особые указания

Применение при нарушениях функции печениПрепарат противопоказан при тяжелых нарушениях функции печени.Применение при нарушениях функции почекПрепарат противопоказан при тяжелых нарушениях функции почек.Применение у детейПротивопоказание: детский возраст до 12 лет.При случайном проглатывании мази следует обратиться к врачу.Нельзя наносить мазь на поврежденную кожу.При случайном попадании на слизистые оболочки мазь вызывает сильное раздражение. После применения мази необходимо тщательно вымыть руки, чтобы избежать попадания мази в глаза и на слизистые оболочки.При попадании мази в глаза и на слизистые оболочки необходимо обильно промыть их водой.Влияние на способность к управлению транспортными средствами и механизмамиПрименение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Условия хранения

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С. Не хранить в холодильнике и морозильной камере. Срок годности - 3 года.