Инструкция по применению
Витабакт Капли глазные 10 мл

Характеристики



Форма выпуска: Капли
Страна: Франция
Производитель: Теа Фарма
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Пиклоксидин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 0.05%
Срок годности: 24.0

Действующее вещество

Пиклоксидин

Состав

Действующее вещество: ПиклоксидинВспомогательные вещества: декстроза безводная, полисорбат 80, вода очищенная.Концентрация действующего вещества (мкг): 500 мкг

Форма выпуска

Капли

Фармакокинетика

При местном применении системная абсорбция пиклоксидина низкая.

Показания

- бактериальные инфекции переднего отдела глаза; - дакриоцистит; - профилактика инфекционных осложнений в послеоперационном периоде после хирургических вмешательств в области переднего отдела глаза.

Способ применения и дозы

При лечении бактериальных инфекций препарат закапывают по 1 капле в каждый глаз 2-6 раз/сут. Продолжительность лечения - 10 дней, целесообразность и необходимость увеличения срока лечения больше 10 дней должна определяться врачом. В послеоперационном периоде препарат закапывают по 1 капле в каждый глаз 3-4 раза/сут. Витабакт также может использоваться в рамках предоперационной подготовки (для профилактики послеоперационных осложнений) по 1-2 капли непосредственно перед хирургическим вмешательством. Правила использования препаратаЗакрутив до конца колпачок-перфоратор, проколоть наконечник флакона. Открыв колпачок, закапать капли в нижний конъюнктивальный мешок глаза, глядя вверх и осторожно оттянув нижнее веко. Не касаться глаза и века наконечником флакона.

Противопоказания

- возраст до 18 лет; - повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Поскольку применение препарата при беременности и в период лактации не изучалось, Витабакт не рекомендуется назначать беременным и кормящим женщинам.

Побочные действия

Редко: аллергические реакции в виде конъюнктивальной гиперемии.

Передозировка

Данные о передозировке препарата Витабакт отсутствуют.

Взаимодействие с другими препаратами

Взаимодействие препарата Витабакт с другими лекарственными средствами в настоящее время не известно.

Особые указания

При одновременном применении с другими офтальмологическими препаратами перерыв между закапываниями должен составлять не менее 15 мин.Витабакт не окрашивает контактные линзы, включая мягкие гидрофильные, однако при инфекционных заболеваниях глаз ношение контактных линз противопоказано.Не следует использовать глазные капли Витабакт для субконъюнктивальных инъекций или вводить в переднюю камеру глаза.Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмамиПри снижении четкости зрения на фоне лечения препаратом пациентам следует отказаться от управления автотранспортом и работы с механизмами.

Условия хранения

В сухом месте