Инструкция по применению
Витамиа йод таблетки 100 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Внешторгфарма
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 100



Описание

Йод необходим для образования гормонов щитовидной железы — трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4). В составе гормонов щитовидной железы йод: контролирует энергетический обмен (выработку тепла и интенсивность затрат), активно воздействует на физическое и психическое состояние, эмоциональный тонус, участвует в регуляции функционального состояния центральной нервной системы и сердечно-сосудистой системы, взаимодействует с другими железами внутренней секреции (в особенности с гипофизом и половыми железами), способствует дифференцировке и созреванию тканей, оказывает выраженное влияние на водно-солевой, белковый и углеводный обмен. Йод в организме не синтезируется и должен поступать с пищей. Признаки дефицита йода: -Дефицит йода вызывает разрастание ткани щитовидной железы (зоб), -Умеренный недостаток йода, не приводящий к развитию зоба, проявляется угнетением обменных процессов, снижением физической и умственной работоспособности, апатией и заторможенностью, отеком тканей, нарушением деятельности сердца. Дополнительный прием йода предупреждает развитие зоба, улучшает обмен веществ, повышает физическую активность, стимулирует умственную деятельность, улучшает эмоциональный фон.

Состав

Декстроза, микрокристаллическая целлюлоза, гидроксипропилметилцеллюлоза, магния стеарат, мальтодекстрин, тальк, диоксид титана, диоксид кремния аморфный, кроскарамеллоза натрия, пропиленгликоль.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Для преодоления йодного дефицита, •для снижения риска развития заболеваний, связанных с дефицитом йода.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 14 лет по 1-2 таблетки 1 раз в день во время еды. При приеме таблеток «Йод-Актив» необходимо учитывать, что по данным Российских исследований поступление йода с пищей составляет 40 мкг в день

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов. Беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Не является лекарственным средством.