Инструкция по применению
Витамин Е (альфа-Токоферола ацетат) Капсулы 200 мг 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Алтайвитамины
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 30

Описание

Мягкие желатиновые капсулы сферической формы красного цвета,имеющие гладкую поверхность, без повреждений и видимых воздушных включений. Заполнены маслянистой жидкостью от светло-желтого до темно-желтого цвета без прогорклого запаха.

Состав

На одну капсулу: альфа-Токоферола ацетат, подсолнечника масло, желатин, глицерин, сорбит, вода очищенная, краситель азорубин (кармуазин Е-122), метилпарагидроксибензоат.

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

Абсорбция из двенадцатиперстной кишки (требует присутствия солей желчных кислот, жиров, нормальной функции поджелудочной железы) - 50-80 %. Связывается с бета-липопротеинами крови. При нарушении обмена белков транспорт затрудняется. Время достижения максимальной концентрации -4 ч. Депонируется во всех органах и тканях, особенно в жировой ткани. Проникает через плаценту в недостаточных количествах: в кровь плода проникает 20-30 % от концентрации в крови матери. Проникает в грудное молоко. Метаболизируется в печени до производных, имеющих хиноновую структуру (некоторые из них обладают витаминной активностью). Выводится с желчью - более 90 % (некоторое количество вновь всасывается и подвергается энтерогепатической циркуляции), почками - 6 % (в виде глюкуронидов токофероновой кислоты и ее гамма-лактона).

Показания

Лечение гипо- и авитаминоза витамина Е.

Способ применения и дозы

Внутрь. Лечение гипо- и авитаминоза Е: по одной капсуле 1 раз в сутки в течение 20 - 40 дней.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 3 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

При беременности и в период грудного вскармливания препарат назначают только под наблюдением врача в среднесуточной дозе для взрослых в зависимости от показания.

Побочные действия

Аллергические реакции, диспепсия.

Передозировка

Симптомы: при приеме в течение длительного периода в дозах 400-800 ЕД/сут (1 мг=1. 21 МЕ) - нечеткость зрительного восприятия, головокружение, головная боль, тошнота, необычайная усталость, диарея, гастралгия, астения, при приеме более 800 ЕД/сут в течение длительного периода - увеличение риска развития кровотечений у больных с гиповитаминозом К, нарушение метаболизма тиреоидных гормонов, расстройства сексуальной функции, тромбофлебит, тромбоэмболия. Лечение - симптоматическое, отмена препарата, назначение глюкокортикостероидов.

Взаимодействие с другими препаратами

При совместном применении облегчает абсорбцию, депонирование в печени и усвоение витамина А. Назначение витамина Е в высоких дозах может вызвать дефицит витамина А в организме. Одновременное применение витамина Е в дозе более 400 ЕД/сут с антикоагулянтами (производными кумарина и индандиона) повышает риск развития гипопротромбинемии и кровотечений. Колестирамин, колестипол, минеральные масла снижают всасывание витамина Е. Высокие дозы железа усиливают окислительные процессы в организме, что повышает потребность в витамине Е.

Особые указания

Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Нет данных о негативном влиянии.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре от 5 до 20 °С. Хранить в недоступном для детей месте.