Инструкция по применению
Витапрост Суппозитории ректальные 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Суппозитории
Страна: Россия
Производитель: Нижфарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Простаты экстракт
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 10 мг
Срок годности: 24.0



Описание

Суппозитории торпедообразной формы от белого до белого с желтоватым или серовато-буроватым оттенком цвета. допускается появление белого налета на поверхности суппозитория и наличие на срезе воздушного стержня и воронкообразного углубления.

Действующее вещество

Простаты экстракт

Состав

Один суппозиторий содержит: действующее вещество: простаты экстракт — 50 мг, в пересчете на водорастворимые пептиды — 10 мг, вспомогательные вещества: жир твердый (Витепсол, марки H 15, W 35, Суппосир, марки NA 15, NAS 50) — достаточное количество до получения суппозитория массой 1,25 г.

Форма выпуска

Суппозитории

Показания

Хронический простатит. Состояния до и после оперативных вмешательств на предстательной железе.

Способ применения и дозы

Ректально, по 1 суппозиторию после самопроизвольного опорожнения кишечника или клизмы 1 раз в день. После введения суппозитория желательно пребывание пациента в постели в течение 30-40 минут. Длительность курса лечения препаратом Витапрост® — не менее 10 дней. При необходимости возможно проведение повторных курсов. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Побочные действия

Аллергические реакции. Если любые из указанных выше побочных эффектов усугубляются или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

О случаях передозировки препарата Витапрост® не сообщалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат может применяться в комплексной терапии. Случаи взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными средствами не описаны.

Особые указания

Применяют только для лечения взрослых мужчин, не применяют у женщин и детей. Лечение хронического простатита должно быть комплексным, предполагающим наряду с назначением препарата Витапрост® применение других групп лекарственных препаратов и немедикаментозных методов лечения. До начала лечения хронического простатита и, при необходимости, в процессе лечения рекомендуется проводить анализ секрета предстательной железы. В период применения препарата для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы следует регулярно посещать врача для проведения стандартного контроля данного заболевания. Прежде чем начать курс лечения необходимо убедиться, что патология носит доброкачественный характер.

Условия хранения

В сухом месте