Инструкция по применению
Витапрост Таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 20 мг 60 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Штада
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Простаты экстракт
Количество в упаковке: 60
Дозировка действующего вещества: 20 мг



Описание

Таблетки от голубого до светло-синего цвета, круглые, двояковыпуклые, допускается наличие вкраплений.

Действующее вещество

Простаты экстракт

Состав

Одна таблетка содержит: активное вещество: простаты экстракт 100 мг (в пересчёте на водорастворимые пептиды 20 мг); вспомогательные вещества: сахароза 28,500 мг, лактозы моногидрат 7,125 мг, кальция стеарата моногидрат 2,500 мг, кросповидон 9,275 мг, целлюлоза микрокристаллическая до 102,600 мг; состав оболочки: акрилиз (метакриловой кислоты и этилакрилата сополимер [1:1], титана диоксид, тальк, триэтилцитрат, кремния диоксид коллоидный, натрия гидрокарбонат, натрия лаурилсульфат, индигокармин) 25 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Хронический абактериальный простатит. Профилактика обострений хронического абактериального простатита. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы. Состояния до и после оперативных вмешательств на предстательной железе.

Способ применения и дозы

Внутрь, по 1 таблетке 2 раза в день. Длительность курса лечения препаратом Витапрост® при доброкачественной гиперплазии предстательной железы - не менее 30 дней, при хроническом простатите - не менее 10 дней. Для профилактики обострений хронического простатита применяют по 1 таблетке 2 раза в день в течение не менее 30 дней - 1-2 раза в год.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата. Дефицит лактазы, дефицит сахаразы /изомальтазы, непереносимость лактозы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция (препарат содержит лактозу и сахарозу).

Побочные действия

Крайне редко - аллергические реакции. Если любые из указанных выше побочных эффектов усугубляются или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

О случаях передозировки препарата не сообщалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Если Вы принимаете любые другие препараты, то перед началом лечения следует проконсультироваться с врачом. Случаи взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными средствами не описаны.

Особые указания

Лечение хронического простатита и состояний до и после оперативных вмешательств на предстательной железе должно быть комплексным, предполагающим наряду с назначением таблеток Витапрост® применение других групп лекарственных препаратов и немедикаментозных методов лечения. Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.: Не влияет на способность управлять автомобилем и другими механизмами.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.