Инструкция по применению
Витрум бэби таблетки жевательные 60 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки жевательные
Страна: Соединенные Штаты Америки
Производитель: Unipharm
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Поливитамины+Минералы
Количество в упаковке: 60
Срок годности: 60.0

Действующее вещество

Поливитамины+Минералы

Состав

Бетакаротен 1500 МЕ (900 мкг) D-α-токоферола ацетат (вит. Е) 6 МЕ (4.5 мг) колекальциферол (вит. D3) 200 МЕ (5 мкг) фитоменадион (вит. К1) 10 мкг Аскорбиновая кислота (вит. С) 60 мг тиамина мононитрат (вит. В1) 700 мкг рибофлавин (вит. В2) 800 мкг пантотеновая кислота (в форме кальция пантотената) 3 мг пиридоксина гидрохлорид (вит. В6) 1 мг фолиевая кислота (вит. Вс) 150 мкг цианокобаламин (вит. В12) 1.1 мкг никотинамид (вит. РР) 10 мг биотин (вит. Н) 20 мкг кальций (в форме кальция карбоната) 100 мг магний (в форме магния оксида) 40 мг фосфор (в форме кальция гидрофосфата) 20 мг железо (в форме железа фумарата) 9 мг медь (в форме меди оксида) 1 мг цинк (в форме цинка оксида) 10 мг марганец (в форме марганца сульфата) 1 мг йод (в форме калия йодида) 80 мкг молибден (в форме натрия молибдата) 20 мкг селен (в форме натрия селената) 25 мкг хром (в форме хрома аминоата) 20 мкг Вспомогательные вещества: сорбитол - 235.38 мг, масло семян хлопчатника - 40 мг, мальтодекстрин - 23.4 мг, сок апельсина - 20 мг, камедь гуаровая (Е412) - 20 мг, кремния диоксид коллоидный - 12 мг, магния стеарат - 8 мг, лимонная кислота - 5 мг, краситель куркумин (Е100) - 2.5 мг, краситель кармин красный (Е120) - 2.5 мг, ароматизатор французская ваниль - 3.75 мг, сукралоза - 1.3 мг, ароматизатор французская ваниль натуральная - 1.25 мг.

Форма выпуска

Таблетки жевательные

Показания

Профилактика дефицита витаминов или минеральных веществ, входящих в состав препарата, у детей 3-5 лет: — в период интенсивного роста и развития; — в период выздоровления после перенесенных заболеваний; — при несбалансированном или неполноценном питании; — при повышенных физических и эмоциональных нагрузках.

Способ применения и дозы

Детям в возрасте от 3 до 5 лет - по 1 таб./сут. Внутрь после еды, разжевав таблетку. Курс приема препарата - 2-3 месяца. Повторные курсы - по рекомендации врача. Побочное действие Возможны аллергические реакции на компоненты препарата.

Противопоказания

— гипервитаминоз A и D; — гипертиреоз; — болезнь Вильсона-Коновалова; — детский возраст до 3 лет; — повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата.

Передозировка

Симптомы: тошнота, слабость, желудочно-кишечные нарушения. При случайной передозировке следует обратиться к врачу. Лечение: активированный уголь внутрь; промывание желудка; проведение симптоматической терапии.

Взаимодействие с другими препаратами

Не рекомендуется одновременный прием с другими препаратами, содержащими витамины A, E, D, железо и йод. Это увеличивает риск возникновения передозировки.

Особые указания

Не следует превышать рекомендуемую дозу. Возможно окрашивание мочи в интенсивный желтый цвет, что не представляет опасности, т.к. обусловлено наличием рибофлавина в составе препарата, окрашивание стула в темный цвет, что также не представляет опасности, т.к. обусловлено наличием железа в составе препарата.

Условия хранения

В сухом месте