Инструкция по применению
Витрум Юниор Плюс Таблетки жевательные 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки жевательные
Страна: Соединенные Штаты Америки
Производитель: Такеда Фармасьютикалс
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Поливитамины
Количество в упаковке: 30

Описание

Бад -дополнительный источник витаминов а, d3, е, с, в1, в2, в3 (ниацинамида), в5 (пантотеновой кислоты), в6, в12, фолиевой кислоты, биотина, минеральных веществ: магния, железа, цинка, меди, марганца, йода, содержащей кальций, витамин к1.

Действующее вещество

Поливитамины

Состав

Коричневый сахар, кальция фосфат, регулятор кислотности лимонная кислота, витамин C (аскорбиновая кислота, натрия аскорбат), магния оксид, ниацинамид, стабилизатор магниевая соль стеариновой кислоты, стабилизатор кремния диоксид, железа фумарат, носитель целлюлоза микрокристаллическая, витамин E ацетат, стабилизатор стериновая кислота, натуральный ароматизатор апельсина (мальтодекстрин, натуральный апельсиновый ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, антиокислитель бутилгидрокситолуол), цинка оксид, витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид), витамин B2 (рибофлавин), витамин B5 (пантотенат кальция), витамин B1 (тиамина мононитрат), витамин A ацетат, фолиевая кислота, витамин D3 (холекальциферол), марганца сульфат, биотин, натуральный ароматизатор ананаса (декстроза, натуральный ароматизатор ананас, стабилизатор кремния диоксид), витамин K1 (фитоменадион), меди карбонат, калия йодид, краситель оксид железа желтый, витамин B12 (цианокобаламин)

Форма выпуска

Таблетки жевательные

Показания

В качестве биологически активной добавки к пище - дополнительного источника витаминов A, D3, E, C, B1, B2, B3 (ниацинамида), B5 (пантотеновой кислоты), B6, B12, фолиевой кислоты, биотина, минеральных веществ: магния, железа, цинка, меди, марганца, йода, содержащей кальций, витамин K1. Восполнение недостатка витаминов и минералов у детей 7-14 лет. Поддержка роста и развития ребенка.

Способ применения и дозы

Детям от 7 до 14 лет по 1 жевательной таблетке в день во время еды. Продолжительность приема — 2-3 недели. При необходимости прием можно повторить через месяц.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта, нарушения углеводного обмена. Перед применением проконсультироваться с врачом-педиатром. Детям с заболеваниями щитовидной железы проконсультироваться с врачом-эндокринологом.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте при температуре от 15°C до 25°C и при относительной влажности воздуха не выше 60%.