Инструкция по применению
Витрум кальций + витамины Д таблетки 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Соединенные Штаты Америки
Производитель: Unipharm
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Кальция карбонат+Колекальциферол
Количество в упаковке: 30

Описание

Витаминный комплекс Витрум Кальций + Витамин D3 - эффективный препарат для ранней профилактики остеопороза и коррекции Са-дефицитный состояний. Рекомендуется для применения подросткам, беременным и в течении все жизни для укрепления костей, зуб и волос. Результаты многочисленных клинических исследований подтверждают высокую эффективность, хорошую переносимость и безопасность препарата.

Действующее вещество

Кальция карбонат+Колекальциферол

Состав

Кальций, витамин D3.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Применяется в качестве лечебно-профилактического средства: для восполнения дефицита кальция и/или витамина D3 в период интенсивного роста в подростковом и юношеском возрасте (для достижения максимального пика костной массы), женщинам во время беременности и кормления грудью, для профилактики и базовой терапии остеопороза (менопаузальный, сенильный, стероидный, идиопатический и др.) и его осложнений (переломы костей), для восполнения недостатка кальция и витамина D3 у лиц пожилого возраста.

Способ применения и дозы

Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Внутрь. В качестве профилактического средства взрослым и детям старше 12 лет, беременным и кормящим женщинам по 1-2 таблетки в день. Для увеличения всасывания кальция предпочтительно запивать таблетку кислым питьем (апельсиновый или лимонный сок). Для курсовой профилактики остеопороза по 2 таблетки в день, одна утром и одна вечером, преимущественно во время еды. Для терапии остеопороза курс и дозировка в соответствии с рекомендациями врача.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к одному из компонентов препарата, гипервитаминоз D, выраженные нарушения функции почек, гиперкальциемия (повышенное содержание кальция в крови - у лиц с усиленной функцией паращитовидных желез), гиперкальциурия (повышенное выделение кальция с мочой), мочекаменная болезнь (образование кальциевых камней), декальцинирующие опухоли (миелома, костные метастазы, саркоидоз), остеопороз, обусловленный иммобилизацией, туберкулез легких (активная форма), детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Женщинам в период беременности и лактации принимать препарат для восполнения дефицита кальция.

Побочные действия

Возможные аллергические реакции на компоненты препарата. Может наблюдаться дисфункция желудочно-кишечного тракта (запоры, диарея, метеоризм, тошнота, боль в животе). В случае длительного приема возможно увеличение содержания кальция в крови и моче.

Взаимодействие с другими препаратами

Активность витамина D3 может снижаться при его одновременном применении с фенитоином или барбитуратами. При одновременном лечении сердечными гликозидами необходим контроль ЭКГ и клинического состояния, т.к. кальций усиливает действие сердечных гликозидов. Препарат замедляет всасывание антибиотиков группы тетрациклина, ацетилсалициловой кислоты и других салицилатов, сульфаниламидов, бета-адреноблокаторов и антикоагулянтов непрямого действия. В связи с этим препарат рекомендуется применять за 2 часа или через 2 часа после приема других лекарственных средств. При одновременном применении диуретиков из группы тиазидов увеличивается риск возникновения гиперкальциемии. Колестирамин, слабительные препараты (парафиновое масло) снижают абсорбцию витамина D.

Особые указания

В период лечения необходимо постоянно контролировать выведение кальция с мочой и концентрацию кальция и креатинина в плазме (в случае появления кальциурии, превышающей 7,5 ммоль/сут (300 мг/сут), необходимо уменьшить дозу или прекратить прием). Детям до 12 лет препарат рекомендуется применять только по назначению врача. Во избежание передозировки необходимо учитывать дополнительное поступление витамина D3 из других источников. Не применять одновременно с витаминными комплексами, содержащими кальций и витамин D3. У пожилых людей потребность в кальции составляет 1,5 г/сут, в витамине D3 500-1000 МЕ/сутки.