Инструкция по применению
Витрум Мемори таблетки 60 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Соединенные Штаты Америки
Производитель: Unipharm
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гинкго двулопастного листьев экстракт
Количество в упаковке: 60
Срок годности: 36.0

Действующее вещество

Гинкго двулопастного листьев экстракт

Состав

Одна таблетка содержит: гинкго двулопастного листьев экстракт (флавоновых гликозидов 24%*) 60 мг

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Витрум Мемори не предоставлены.

Показания

Снижение внимания, памяти, быстроты мышления, ухудшение интеллектуальных способностей, слуха, зрения, речевых функций (в том числе в результате возрастных изменений).В комплексной терапии нарушений периферического кровообращения и микроциркуляции нижних конечностей.

Способ применения и дозы

Внутрь, во время еды, по 1 таблетке 2 раза в сутки. Средняя продолжительность лечения - 3 месяца. Повторные курсы после консультации с врачом.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, гипокоагуляция, острые нарушения мозгового кровообращения, острый инфаркт миокарда, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, эрозивный гастрит, артериальная гипотензия, беременность, период лактации, детскийвозраст.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Диспепсия, головная боль, кожные аллергические реакции, головокружение.

Передозировка

Симптомы: тошнота, слабость, желудочно-кишечные расстройства. Лечение: активированный уголь внутрь, промывание желудка, симптоматическая терапия. В случае передозировки необходимо обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими препаратами

Следует избегать комбинации с ацетилсалициловой кислотой, варфарином, тиазидными диуретиками, трициклическими антидепрессантами, противосудорожными препаратами, гентамицином.

Особые указания

Не следует превышать рекомендуемую дозу препарата. Улучшение состояния проявляется, как правило, через 1 месяц после начала лечения. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами: В период приема препарата не рекомендуется выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами).

Условия хранения

В защищенном от солнца помещении