Инструкция по применению
Витрум Остеомаг таблетки 60 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Соединенные Штаты Америки
Производитель: Unipharm
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Поливитамины+Минералы
Количество в упаковке: 60



Описание

Витаминный комплекс Витрум Остеомаг - препарат для профилактики и комплексного лечения остеопороза, содержащий кальций, витамин D3 и магний. Эффективен при постменопаузальном остеопорозе и переломах. Увеличивает минеральную плотность и укрепляет кости. Уменьшает интенсивность болевого синдрома. Предупреждает развитие переломов. Магний снижает угрозу образования оксалатных камней.

Действующее вещество

Поливитамины+Минералы

Состав

Карбонат кальция, витамин Д3, оксид магния, оксид цинка, оксид меди, сульфат марганца, борат натрия.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Профилактика и комплексная терапия остеопороза (менопаузальный, сенильный, стероидный, идиопатический и др.) и его осложнений (переломы костей).
Восполнение дефицита кальция, магния и витамина D3 во время и после менопаузы.
Восполнение дефицита кальция, магния и витамина D3 у лиц пожилого возраста.

Способ применения и дозы

Внутрь. Взрослым, для профилактики и комплексной терапии остеопороза и его осложнений, восполнения дефицита кальция, магния и витамина D3 во время и после менопаузы, а также у лиц пожилого возраста - по 1-2 таблетки в день. Курс приема в соответствии с рекомендациями врача. Детям старше 12 лет для профилактики и комплексной терапии остеопороза и его осложнений - по 1-2 таблетки в день. Курс приема в соответствии с рекомендациями врача.

Противопоказания

Выраженные нарушения функции почек, повышенное содержание кальция в моче или крови (гиперкальциурия, гиперкальциемия), мочекаменная болезнь (образование кальциевых камней), повышенное выделение кальция с мочой. Повышенная чувствительность к витамину D3 и другим компонентам препарата. Детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

В период беременности суточная доза кальция не должна превышать 1500 мг.

Побочные действия

Возможные аллергические реакции на компоненты препарата. Может наблюдаться дисфункция желудочно-кишечного тракта (запор или понос, вздутие живота, боли в эпигастрии, тошнота). При длительном применении в высоких дозах возможно увеличение содержания кальция в моче и крови.

Передозировка

Симптомы передозировки: тошнота, слабость, желудочно-кишечные расстройства. В случае передозировки необходимо обратиться к врачу. Лечение: активированный уголь внутрь, промывание желудка, симптоматическое лечение.

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат замедляет всасывание антибиотиков группы тетрациклина, ацетилсалициловой кислоты и других салицилатов, сульфаниламидов, бета-адреноблокаторов и антикоагулянтов непрямого действия. В связи с этим препарат рекомендуется применять за 2 часа или через 2 часа после приема других лекарственных средств. Тиазидные диуретики уменьшают экскрецию кальция с мочой. Поэтому следует иметь в виду риск развития гиперкальциемии при их одновременном применении с препаратом. Назначение в высоких дозах больным, получающим препараты наперстянки, может увеличить риск возникновения аритмий.