Инструкция по применению
Витрум Пренатал форте таблетки 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Соединенные Штаты Америки
Производитель: Unipharm
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Поливитамины+Прочие препараты
Количество в упаковке: 30

Описание

Таблетки капсуловидной формы, покрытые пленочной оболочкой от светло-серого до темно-серого цвета, с гравировкой "PRENATAL" с одной стороны и "FORTE" с другой стороны таблетки, со специфическим запахом.

Действующее вещество

Поливитамины+Прочие препараты

Состав

одна таблетка, покрытая пленочной оболочкой содержит:Активные действующие вещества:Бетакаротен - 1500 мкг1)Ретинола ацетат (Витамин А) - 860 мкг2) Колекальциферол (Витамин D3) - 10 мкг3)Альфа-токоферола ацетат (Витамин Е) - 30 мг4)Аскорбиновая кислота (Витамин С) - 120 мгТиамина мононитрат (Витамин В1) - 3 мгРибофлавин (Витамин В2) - 3,4 мгПиридоксина гидрохлорид (Витамин В6) - 10 мгНикотинамид - 20 мгЦианокобаламин (Витамин В12) - 12 мкгФолиевая кислота - 800 мкгБиотин - 30 мкгКальция пантотенат в пересчете на пантотеновую кислоту - 10 мгКальция карбонат в пересчете на кальций - 200 мгМагния оксид в пересчете на магний - 25 мгЖелеза фумарат в пересчете на железо - 60 мгМеди оксид в пересчете на медь - 2 мгЦинка оксид в пересчете на цинк - 25 мгМарганца сульфат в пересчете на марганец - 5 мгХрома хлорид в пересчете на хром - 25 мкгНатрия молибдат в пересчете на молибден - 25 мкгНатрия селенат в пересчете на селен - 20 мкгКалия йодид в пересчете на йод - 150 мкг1) эквивалентно 2500 МЕ Бетакаротена2) эквивалентно 2500 МЕ Витамина А3) эквивалентно 400 МЕ Витамина D34) эквивалентно 30 МЕ Витамина ЕВспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая - 195,66 мг, стеариновая кислота - 45,00 мг, кроскармеллоза натрия - 28,00 мг, магния стеарат - 15,00 мг, кремния диоксид коллоидный - 7,00 мг. Оболочка: гипромеллоза - 19,500 мг, титана диоксид - 9,860 мг, триацетин - 0,600 мг, краситель бриллиантовый черный (Е151) - 0,036 мг, краситель красный очаровательный (Е129) - 0,004 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

профилактика гиповитаминозов и недостатка минеральных веществ в период подготовки к беременности, во время беременности и в период грудного вскармливания, профилактика железодефицитной анемии у беременных, дефицита кальция в организме матери.

Способ применения и дозы

Перед применением проконсультируйтесь с врачом.Рекомендуется женщинам на этапе планирования беременности, в период беременности и после родов принимать внутрь по одной таблетке в день после завтрака, запивая водой. Курс приема препарата по рекомендации врача.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.Не рекомендуется использовать при гипервитаминозе A и D, избыточном накоплении железа в организме, повышенном содержании кальция в крови, повышенном выделении кальция с мочой и при мочекаменной болезни.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции на компоненты препарата. Возможно окрашивание мочи в интенсивный желтый цвет, что не представляет опасности, так как обусловлено наличием рибофлавина в составе препарата.

Передозировка

Симптомы передозировки: тошнота, слабость, нарушение зрения, желудочно-кишечные расстройства.При случайной передозировке обратиться к врачу.Лечение: активированный уголь внутрь, промывание желудка, симптоматическое лечение.

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат содержит железо и кальций и поэтому может задерживать всасывание в кишечнике антибиотиков из группы тетрациклинов, а также противомикробных средств - производных фторхинолонов. Витамин С усиливает действие и побочные эффекты противомикробных средств из группы сульфаниламидов (в том числе, появление кристаллов в моче). Антацидные препараты, содержащие алюминий, магний, кальций, а также колестирамин, уменьшают всасывание железа. При одновременном назначении мочегонных средств из группы тиазидов увеличивается вероятность гиперкальциемии.

Особые указания

Не превышать рекомендуемую дозу.Не рекомендуется использовать "Витрум® Пренатал Форте" совместно с препаратами, содержащими витамины A и D, во избежание передозировки.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Нет данных.

Условия хранения

В сухом месте, при температуре 10-30°С.Хранить в недоступном для детей месте.