Инструкция по применению
Витрум Пренатал Плюс Таблетки 100 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Соединенные Штаты Америки
Производитель: Такеда Фармасьютикалс
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Поливитамины
Количество в упаковке: 100



Описание

Бад - дополнительный источник витаминов A, D3, E, C, B1, B2, B5, B6, B12, ниацина, фолиевой кислоты, биотина, минеральных веществ: цинка, железа, меди, марганца, йода, хрома, селена, содержащей кальций для беременных и кормящих женщин.

Действующее вещество

Поливитамины

Состав

Кальция карбонат, витамин C (аскорбиновая кислота), железа фумарат, витамин E (dl-альфа токоферола ацетат), магния оксид, цинка оксид, никотинамид, марганца сульфат, кальция-D-пантотенат, бета-каротин, витамин A (ретинол ацетат), фолиевая кислота, витамин D3 (холекальциферол), витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид), витамин B 1 (тиамина нитрат), витамин B2 (рибофлавин), D-биотин, хлорид хрома, меди оксид, калия йодид, натрия селенат, витамин B12 (цианокобаламин). Содержание активных веществ в 1 таблетке: Витамин A-0,75 РЭ; Бета-каротин-1,5 мг; Витамин E-20,1 ТЭ; Витамин D3-10 мкг; Витамин C-120 мг; Витамин B1-3 мг; Витамин B2-3,4 мг; Витамин B6-3 мг; Фолиевая кислота-400 мкг; Витамин B12-4,5 мкг; Ниацин-20 мг; Витамин B5-7 мг; Биотин-30 мкг; Кальций-200 мг; Железо-32 мг; Цинк-18 мг; Медь-2 мг; Марганец-3,3 мг; Хром-25 мг; Йод-150 мг; Селен-25 мг. Вспомогательные вещества: Целлюлоза микрокристаллическая, стеариновая кислота, кроскармеллоза, оболочка таблетки «Опадрай II белый»

(гидроксипропилметилцеллюлоза, титана диоксид, полидекстроза, тальк, мальтодекстрин, среднецепочечные триглицериды), диоксид кремния, магниевая соль стеариновой кислоты, Витамин A — Фактор роста и дифференцировки клеток. Способствует развитию легочной ткани плода, регуляции функции поверхностно-активных белков альвеол плода. Участвует в формировании барьерного (местного) иммунитета, препятствует развитию вирусных инфекций. Способствует развитию плаценты, росту, нормальному развитию и дифференцировки эмбриональных тканей, в т.ч. эпителиальных структур и костной ткани. Участвует в формировании зрительных пигментов, необходимых для нормального сумеречного и цветового зрения, обеспечивает целостность эпителиальных тканей. Бета-каротин является природным провитамином A, обладает свойствами антиоксиданта, блокирующий перекисные соединения, способные вызывать предраковые изменения в клетках. Бета-каротин избавляет от многих расстройств зрения, участвует в формировании костных тканей и зубов, поддерживает в здоровом состоянии кожу, волосы, слизистые оболочки, повышает сопротивляемость организма к респираторным и иным инфекциям. Бета-каротин в случае дефицита ретинола (витамина A) может распадаться на две молекулы ретинола. Витамин E — поддерживает нормальное течение всей беременности. Антиоксидант предохраняющий от разрушения другие витамины. Поддерживает стабильность эритроцитов, предупреждает гемолиз, оказывает положительное влияние на функции половых желез, нервной и мышечной ткани. Витамин D3 — обеспечивает обмен кальция и фосфатов, рост костного скелета плода, способствует минерализации костей, формированию костного скелета и зубов у детей, необходим для нормального функционирования паращитовидных желез. Препятствует развитию преэклампсии у беременных и преждевременных родов. Витамин C — обеспечивает синтез коллагена, карнитина, дофамина, тирозина, норадреналина, гормонов гипофиза, щитовидной железы и стероидных гормонов. Влияет на образование гемоглобина, созревание эритроцитов. Витамин C повышает устойчивость организма к инфекциям, снижает воспалительные реакции. Витамин B1 (тиамин) — участвует в процессах усвоения простых сахаров. Препятствует избыточному набору массы тела беременной. Участвует в функционировании и формировании нервной системы плода. Витамин B2 (рибофлавин) — участвует в метаболизме углеводов, жиров и белков матери и плода. Противодействует развитию мастита во время кормления. Важнейший катализатор процессов клеточного дыхания и зрительного восприятия плода. Ниацин (витамин B3, витамин PP, никотинамид) —

обеспечивает синтез важнейших кофакторов ферментов (группы НАД): репарацию ДНК, синтез стероидных гормонов, детоксикацию ксенобиотиков, энергетический метаболизм. Участвует в формировании сосудов плаценты. Пантотеновая кислота (Витамин B5) — участвует в метаболизме углеводов, жиров и белков. Способствует быстрому заживлению тканей после родов. Обеспечивает репаративную функцию тканей. Витамин B6 (пиридоксин) — участвует в метаболизме аминокислот. Противодействует появлению токсикоза беременных, судорог. Обеспечивает нормальное усвоение магния. В качестве коэнзима принимает участие в белковом обмене и синтезе нейромедиаторов. Необходим для фолиевой кислоты (фолатный цикл). Во время беременности необходим женщинам, ранее принимавшим пероральные контрацептивные средства, истощающие запасы пиридоксина организме. Биотин (витамин B7) — участвует в углеводном и жировом обменах веществ. Формирует нормальный кожный покров плода. Поддерживает нормальный уровень сахара крови, препятствует возникновению сахарного диабета. Фолиевая кислота (витамин B9, Bc) — участвует в синтезе ДНК, метилировании ДНК. Обеспечивает рост всех клеток эмбриона. На ранних стадиях беременности снижает риск развития у плода дефектов нервной трубки, а также риск возникновения пороков челюстно-лицевой области. Витамин B12 (цианокобаламид) — участвует в катаболизме (распад и ресинтез) аминокислот, жирных кислот и нуклеотидов. Обеспечивает рост всех клеток эмбриона. Является важным фактором кроветворения и развития эпителиальных клеток, необходим для метаболизма фолиевой кислоты (фолатный цикл) и синтеза миелина. Повышает устойчивость эритроцитов к гемолизу. Повышает способность тканей к регенерации. Железо — участвует в эритропоэзе, в составе гемоглобина обеспечивает транспорт кислорода в ткани, предупреждает развитие анемии у беременных женщин, особенно во II и III триместрах беременности. Железо способствует нормальному развитию когнитивных функций младенца. Цинк — участвует в нормальном формировании скелета плода и регенерации тканей, участвует в образовании некоторых гормонов, включая инсулин, снижает вероятность развития внутриутробных аномалий. В комплексе с витамином A способствует формированию нормального сумеречного и цветового зрения. Медь — предупреждает анемию и кислородное голодание органов и тканей, способствует профилактике остеопороза. Способствует укреплению стенок сосудов. Марганец — способствует минерализации костной ткани. Обладает противовоспалительными свойствами. Хром — повышает чувствительность тканей к инсулину, снижает риск нарушения толерантности

к глюкозе и гестационного диабета. Йод — необходим для формирования тиреоидных гормонов и нормальной функции щитовидной железы: участвует в липидном и белковом обменах. Снижает риск возникновения осложнений во время беременности, возникающих на фоне дефицита потребления йода: внутриутробной гибели плода и самопроизвольного прерывания беременности. Предупреждает отставания в умственном и физическом развитии. Селен — обеспечивает антиоксидантную защиту клеточных мембран, потенцирует действие витамина Е. Необходим для нормальной работы иммунной системы. Кальций — участвует в регуляции нервной проводимости, мышечных сокращений и является компонентом системы свертывания крови, увеличивает плотность костной ткани.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище — дополнительного источника витаминов A, D3, E, C, B1, B2, B5, B6, B12, ниацина, фолиевой кислоты, биотина, минеральных веществ: цинка, железа, меди, марганца, йода, хрома, селена, содержащей кальций для беременных и кормящих женщин. Для хорошего самочувствия матери и правильного развития плода. Восполнение недостатка витаминов и минералов во время беременности, а также снижение риска развития гиповитаминозов и недостатка минеральных веществ в послеродовой период и в период кормления, Снижение риска развития железодефицитной анемии у беременных и дефицита йода в организме матери и плода. Целесообразно начать прием на этапе планирования беременности либо как можно раньше в процессе беременности, а также продолжить в послеродовый период и период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Беременным и кормящим женщинам принимать по 1 таблетке в день во время еды

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Женщинам с заболеваниями щитовидной железы проконсультироваться с врачом-эндокринологом.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте при температуре от 15°C до 25°C и при относительной влажности воздуха не выше 60%.