Инструкция по применению
Витрум Пренатал таблетки 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Соединенные Штаты Америки
Производитель: Unipharm
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Поливитамины+Минералы
Количество в упаковке: 30

Описание

Капсуловидные таблетки, покрытые пленочной оболочкой от светло-розового до темнорозового цвета. Допускается наличие специфического запаха.

Действующее вещество

Поливитамины+Минералы

Состав

Одна таблетка, покрытая пленочной оболочкой содержит:Активные действующие вещества:Ретинола ацетат (Витамин А) - 4000 МЕ1)Колекальциферол (Витамин D3) - 400 МЕ2)Альфа-токоферола ацетат (Витамин Е) - 11 МЕ3)Аскорбиновая кислота (Витамин С) - 100 мгТиамина мононитрат (Витамин В1) - 1,5 мгРибофлавин (Витамин В2) - 1,7 мгПиридоксина гидрохлорид (Витамин В6) - 2,6 мгНикотинамид - 18 мгЦианокобаламин (Витамин В12) - 4 мкгФолиевая кислота - 800 мкгкальция карбонат в пересчете на кальций, кальция сульфат в пересчете на кальций - 200 мгЖелеза фумарат в пересчете на железо - 60 мгЦинка оксид в пересчете на цинк - 25 мг1)Эквивалентно 1,376 мг ретинола ацетата2)эквивалентно 10 мкг колекальциферола3)Эквивалентно 11 мг альфа-токоферола ацетатаВспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая - 217,42 мг, стеариновая кислота - 45,00 мг, кроскармеллоза натрия - 20,00 мг, магния стеарат - 14,00 мг, кремния диоксид коллоидный - 4,20 мг.Оболочка: гипромеллоза - 16,30 мг, титана диоксид -13,25 мг, краситель солнечный закат желтый (Е110) - 0,25 мг, краситель красный очаровательный (Е129) - 0,20 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

профилактика гиповитаминозов и недостатка минеральных веществ в период подготовки к беременности, во время беременности и в период грудного вскармливания, профилактика железодефицитной анемии у беременных, дефицита кальция в организме матери.

Способ применения и дозы

Перед применением проконсультируйтесь с врачом.Рекомендуется женщинам на этапе планирования беременности, в период беременности и после родов принимать внутрь по одной таблетке в день после завтрака, запивая водой. Курс приема препарата по рекомендации врача.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.Не рекомендуется использовать при гипервитаминозе А и D, избыточном накоплении железа в организме, повышенном содержании кальция в крови, повышенном выделении кальция с мочой и при мочекаменной болезни.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции на компоненты препарата. Возможно окрашивание мочи в интенсивный желтый цвет, что не представляет опасности, так как обусловлено наличием рибофлавина в составе препарата.

Передозировка

Симптомы передозировки: тошнота, слабость, нарушение зрения, желудочно-кишечные расстройства.При случайной передозировке обратиться к врачу.Лечение: активированный уголь внутрь, промывание желудка, симптоматическое лечение.

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат содержит железо и кальций и поэтому может задерживать всасывание в кишечнике антибиотиков из группы тетрациклинов, а также противомикробных средств - производных фторхинолонов. Витамин С усиливает действие и побочные эффекты противомикробных средств из группы сульфаниламидов (в том числе, появление кристаллов в моче). Антацидные препараты, содержащие алюминий, магний, кальций, а также колестирамин, уменьшают всасывание железа. При одновременном назначении мочегонных средств из группы тиазидов увеличивается вероятность гиперкальциемии.

Особые указания

Не превышать рекомендуемую дозу.Не рекомендуется применять "Витрум® Пренатал" совместно с препаратами, содержащими витамины A и D. Это увеличивает риск возникновения передозировки этих витаминов.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Нет данных.

Условия хранения

В сухом месте, при температуре 10-30°С.Хранить в недоступном для детей месте.