Инструкция по применению
Витрум Виталити 50+ Комплекс для поддержания жизненного тонуса Таблетки покрытые оболочкой массой 1400 мг 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Чехия
Производитель: Walmark, a.s.
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 30



Описание

Формула Витрум® Виталити — для поддержки тонуса, жизненной энергии и когнитивных функций. Витамины, А, Е, С, Д, селен и цинк важны для поддержания иммунитета в сезон простуд. Хром и Ванадий — важны для углеводного обмена, улучшения чувствительности к инсулину. Витамины В9, В12 и В6 способствуют профилактике инсультов и ишемии головного мозга. Кальций, магний и витамин D3, поддерживают двигательную активность и прочность костей. Принимать продукт могут люди с сахарным диабетом.

Состав

Кальция карбонат (кальций), антислеживающий агент целлюлоза, экстракт женьшеня, L-аскорбиновая кислота (витамин С), ДМАЕ (диметиламиноэтанола битартрат), оболочка таблетки AquaPolish® F оранжевый 039.24 (стабилизатор гидроксипропилметилцеллюлоза, антислеживающий агент тальк, краситель титана диоксид, антислеживающий агент целлюлоза, агент влагоудерживающий глицерин, краситель оксид железа красный и оксид железа желтый), DL-альфа-токоферола ацетат (витамин Е), цинка цитрат (цинк), марганца глюконат (марганец), никотинамид (витамин В3), стабилизатор карбоксиметилцеллюлоза натриевая соль кроссвязанная, D-пантотенат кальция (витамин В5), антислеживающий агент магния стеарат, ретинола ацетат (витамин А), меди глюконат (медь), антислеживающий агент кремния диоксид, холекальциферол (витамин D3 (400 МЕ)), тиамина гидрохлорид (витамин В1), рибофлавин (витамин В2), пиридоксина гидрохлорид (витамин В6), цианокобаламин (витамин В12), фолиевая кислота.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

В качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного источника витаминов А, С, В1, В2, В3 (РР), В5, В6, В12, D3, Е, фолиевой кислоты, гинсенозидов, минеральных веществ: цинка, марганца, меди, кальция, содержащей диметиламиноэтанол.

Способ применения и дозы

Взрослым по 1 таблетке 1 раз в день во время еды в первой половине дня. Продолжительность приема − 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, повышенное артериальное давление, нарушение ритма сердечной деятельности, бессонница, повышенная нервная возбудимость, беременность, кормление грудью.

Особые указания

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С и относительной влажности не выше 70%.