Инструкция по применению
Визин® Классический Капли глазные флакон 15 мл

Характеристики

Форма выпуска: Капли
Страна: Бельгия
Производитель: Янссен Фармацевтика
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Тетризолин
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 36.0



Действующее вещество

Тетризолин

Состав

На 1 мл: тетризолина гидрохлорид 500 мкг. Вспомогательные вещества: борная кислота, натрия хлорид, динатрия эдетат, бензалкония хлорида раствор 17%, натрия борат, вода очищенная.

Форма выпуска

Капли

Фармакокинетика

Тетризолин практически не всасывается при местном применении.Подробные фармакокинетические исследования при применении глазных капель не проводились.

Показания

- отек и гиперемия конъюнктивы, возникающие при аллергии или обусловленные воздействием химических и физических факторов (дым, пыль, хлорированная вода, свет, косметические средства, контактные линзы).

Способ применения и дозы

Закапывают по 1-2 капли в пораженный глаз 2-3 раза/сут.Не рекомендуется непрерывное применение препарата более 4 дней.При закапывании необходимо снять крышку с флакона-капельницы и перевернуть флакон.Необходимо избегать прикосновения кончика капельницы к каким-либо поверхностями.После применения следует завинтить крышку флакона-капельницы.

Противопоказания

- эндотелиально-эпителиальная дистрофия роговицы;- закрытоугольная глаукома;- детский возраст до 2 лет;- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

С учетом риска развития системных побочных реакций применение препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) возможно только в случаях, когда предполагаемая польза терапии для матери превышает потенциальный риск для плода или грудного ребенка.

Побочные действия

Со стороны органа зрения: в редких случаях - чувство жжения, покраснение глаза, боль и покалывание в глазу, затуманенность зрения, раздражение конъюнктивы, расширение зрачка.Пациента следует предупредить о том, что при развитии любых побочных реакций следует немедленно обратиться к врачу.

Передозировка

При применении препарата в соответствии с инструкцией риск развития передозировки минимален. Однако при попадании препарата в ЖКТ возможны следующие симптомы: расширение зрачка, тошнота, цианоз, лихорадка, судороги, тахикардия, аритмия, остановка сердца, артериальная гипертензия, отек легких, нарушения дыхательной функции, функции ЦНС, кома.Риск появления симптомов передозировки, связанных с всасыванием препарата, высок у новорожденных и детей младшего возраста, особенно при проглатывании капель.Лечение: при необходимости назначают активированный уголь, промывание желудка, ингаляцию кислорода, жаропонижающие и противосудорожные средства. Для снижения АД возможно в/в медленное введение 5 мг фентоламина в физиологическом растворе или прием внутрь фентоламина в дозе 100 мг. Больным с низким АД вазопрессорные средства противопоказаны. Специфический антидот неизвестен.

Взаимодействие с другими препаратами

Лекарственное взаимодействие препарата не изучено.

Особые указания

Перед закапыванием препарата необходимо снять контактные линзы и установить их примерно через 15 мин после инстилляции.Препарат целесообразно применять только при легком раздражении глаз. Пациент должен быть предупрежден, что если в течение 48 ч состояние не улучшается или раздражение и гиперемия сохраняются или нарастают, следует отменить препарат и обратиться к врачу.Пациент должен быть информирован о том, что при появлении интенсивных болей в глазах, головной боли, потери зрения, внезапном появлении плавающих пятен перед глазами, при покраснении глаз, боли при воздействии света или при появлении двоения в глазах необходимо немедленно обратиться к врачу.Не следует применять препарат, если раздражение или гиперемия связаны с серьезными заболеваниями органа зрения, такими как инфекция, инородное тело или химическая травма роговицы.Пациент должен быть информирован о том, что если лекарственное средство пришло в негодность или истек срок годности, то не следует выбрасывать его в сточные воды или на улицу. Необходимо поместить лекарственное средство в пакет и положить в мусорный контейнер. Эти меры помогут защитить окружающую среду.Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмамиВ редких случаях после применения глазных капель наблюдается расширение зрачка и возникает затуманенность зрения, которая может повлиять на способность управлять автомобилем или механизмами.

Условия хранения

Беречь от детей