Инструкция по применению
Визмед мульти гидрогель офтальм. 10мл

Характеристики

Форма выпуска: Капли
Страна: Германия
Производитель: TRB Chemedica
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гиалуронат натрия
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 36.0



Действующее вещество

Гиалуронат натрия

Состав

Гидрогель офтальмологический 0,18% 1 мл натрия гиалуронат 0,18 мг вспомогательные вещества: натрия хлорид; калия хлорид; интал-гидрокарбонат фосфата; натрия цитрат; магния хлорид; кальция хлорид; вода очищенная раствор гипоосмолярный (150 мОсм/л), pH 7,3; не содержит консервантов

Форма выпуска

Капли

Показания

-синдроме сухого глаза и/или: ощущении зуда, раздражения, инородного тела, песка, покраснения глаза, повышенной либо пониженной слезопродукции, ухудшении зрительной работоспособности к вечеру, утомлении глаз, вызванное пылью, задымлением, чрезмерной сухостью воздуха, работой кондиционера, монитора компьютера, ношением контактных линз и другими факторами; -эрозиях роговицы; -ожогах и травмах глаза; -кератитах различной этиологии; -дистрофических заболеваниях роговицы; -до и после хирургических вмешательств на роговице; -в комплексной терапии воспалительных заболеваний глаз.

Способ применения и дозы

Инстилляционно. По 1–2 капли в конъюнктивальный мешок каждого глаза, оттянув нижнее веко. 1–3 раза в день в зависимости от тяжести состояния. Частота закапывания устанавливается индивидуально и в зависимости от ощущений и рекомендаций врача. Частого закапывания не требуется, т.к. раствор создает длительное устойчивое покрытие на поверхности глаза. Можно закапывать на ночь и применять на контактные линзы (твердые или мягкие), не снимая их и не замутняя зрения.

Противопоказания

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Побочные действия

В начале применения может возникнуть кратковременное ощущение жжения во время распространения препарата. Это ощущение быстро проходит, т.к. раствор образует прозрачный вязко-эластичный устойчивый слой, обеспечивая длительное увлажнение и идеально гладкое и полное покрытие поверхности глаза.

Особые указания

При необходимости совместного применения с другими офтальмологическими средствами рекомендуется соблюдать интервалы не менее 30 мин между закапыванием препарата Визмед и применением других глазных капель. Применение глазных мазей допустимо по истечении 30 мин после закапывания Визмед.

Условия хранения

В сухом месте