Инструкция по применению
Визомитин Капли глазные 5 мл

Характеристики



Форма выпуска: Капли
Страна: Россия
Производитель: МИТОТЕХ
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество:
Пластохинонилдецилтрифенилфосфония бромид
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 0,155 мкг/1 мл
Срок годности: 24.0

Действующее вещество

Пластохинонилдецилтрифенилфосфония бромид

Состав

Действующее вещество: Пластохинонилдецилтрифенилфосфония бромид (ПДТФ) 0, 155 мкгВспомогательные вещества: Бензалкония хлорид 0, 1 мг, гипромеллоза 2 мг, натрия хлорид 9 мг, натрия дигидрофосфат дигидрат 0, 81 мг, натрия гидрофосфата додекагидратаКонцентрация действующего вещества (мкг): 0, 155 мкг

Форма выпуска

Капли

Фармакокинетика

Исследований фармакокинетики у человека не проводилось. В доклинических исследованиях на животных распределение ПДТФ в органах и тканях происходило в течение 48 ч после в/в и внутрижелудочного введения. Было обнаружено, что ПДТФ присутствует в наибольших концентрациях в тканях почки, печени и сердце в течение 1 ч после введения. ПДТФ относительно быстро подвергается ферментативному расщеплению и ковалентному связыванию с белками.

Показания

Синдром «сухого глаза».Начальная стадия возрастной катаракты.

Способ применения и дозы

Синдром «сухого глаза»: по 1-2 капли препарата в конъюнктивальный мешок 3 раза в сутки. Длительность курса лечения устанавливается врачом в зависимости от тяжести заболевания.Начальная стадия возрастной катаракты: по 1-2 капли препарата в конъюнктивальный мешок 3 раза в сутки. Длительность курса лечения - 6 месяцев. В ходе терапии препаратом необходимо наблюдение офтальмолога с целью оценки степени прогрессирования заболевания и необходимости продолжения консервативной терапии.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Адекватных контролируемых исследований у беременных и кормящих грудью женщин не проводилось. Не рекомендуется назначать препарат во время беременности. При необходимости назначения в период лактации на период лечения грудное вскармливание следует прекратить.

Побочные действия

Аллергические реакции.Со стороны органов чувств: возможно кратковременное ощущение жжения и рези в глазах после закапывания.

Передозировка

Данные о передозировке при местном применении отсутствуют.

Взаимодействие с другими препаратами

При необходимости можно применять одновременно с другими глазными каплями. При этом перерыв между инстилляциями должен быть не менее 5 минут.

Особые указания

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмамиЕсли после применения препарата возникает кратковременная нечеткость зрения, до его восстановления не рекомендуется управлять транспортными средствами и заниматься видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания.

Условия хранения

В сухом месте