Инструкция по применению
Юнона Спираль био мульти Ag

Характеристики



Форма выпуска: Спираль
Страна: Беларусь
Производитель: Медицинское предприятие Симург
Порядок отпуска: по рецепту
Количество в упаковке: 1

Описание

Спираль Юнона Био Мульти AG имеет Ф-образную форму якоря с выступами на его дугообразных плечиках для лучшего закрепления внутриматочной спирали в матке. Основа внутриматочной спирали изготовлена из биологически инертного пластика. Площадь активной поверхности: 380 мм2, покрыта серебром. Каждая спираль снабжена нитью для контроля расположения и ее извлечения.

Состав

Биологически инертный пластик. Активная поверхность: серебро.

Форма выпуска

Спираль

Показания

Желание женщины предохранить себя от беременности. Лечение и профилактика синдрома Ашермана. В качестве посткоитального средства ВМС может вводиться в течение 3-4 дней после незащищенного полового акта.Предназначено для женщин, родивших несколько детей, сделавших не один аборт и тех девушек, у которых ранее было выпадение спирали.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано при беременности.

Побочные действия

Увеличение менструальной кровопотери. Пред- и межменструальные кровянистые выделения.

Взаимодействие с другими препаратами

Взаимодействия с лекарственными средствами не выявлено, при необходимости диагностического и терапевтического облучения медицинский персонал должен быть информирован о наличии ВМС. В некоторых случаях может потребоваться удаление контрацептива.

Особые указания

Внутриматочная контрацепция абсолютно противопоказана при беременности (подозреваемой или подтвержденной), злокачественных заболеваниях женских половых органов, воспалительных процессах органов малого таза, при кровотечениях из половых органов неустановленной этиологии, при аномалиях развития матки, миоме более 8 недель, эндометриозе любой локализации, аллергии на медь, болезнь Вильсона. С осторожностью (после проведения оценки рисков / преимуществ) необходимо применять ВМС при высоком риске развития заболеваний, передающихся половым путем (наличие нескольких сексуальных партнеров), анемии (гемоглобин менее 90 г/л), у нерожавших женщин, при заболеваниях крови, у пациенток с наличием в анамнезе внематочной беременности.