Инструкция по применению
Вобэнзим Таблетки покрытые оболочкой 200 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки покрытые оболочкой
Страна: Германия
Производитель: Мукос Эмульсионс ГмбХ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Панкреатин+Папаин+Рутозида тригидрат+Бромелаин+Трипсин+Липаза+Амилаза+Химотрипсин
Количество в упаковке: 200
Срок годности: 30.0

Описание

Вобэнзим — это запатентованная комбинация энзимов и рутина для лечения воспалительных заболеваний в гинекологии, урологии и других областях медицины. Вобэнзим в комплексной терапии оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, фибринолитическое, противоотечное, антиагрегантное, вторичноаналгезирующее действие, а также повышает эффективность антибиотиков. Препарат применяется в комплексной терапии таких заболеваний, как воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ), цервицит, вагинит, мастопатия, цистит, простатит, а также для профилактики спаек, фиброза или инфекционных осложнений при перечисленных состояниях.

Действующее вещество

Панкреатин+Папаин+Рутозида тригидрат+Бромелаин+Трипсин+Липаза+Амилаза+Химотрипсин

Состав

Состав: носитель: микрокристаллическая целлюлоза, капсула из гидроксипропилметилцеллюлозы (носитель Е464), кислота аскорбиновая, ликопин (крахмал модифицированный, крахмал кукурузный, ликопин, сироп декстрозы, антиокислители: натрия аскорбат и DL-альфа-токоферол), убихинон, рутин, альфа-токоферола ацетат (мальтодекстрин, крахмал модифицированный, DL-альфа-токоферол ацетат, антислеживающий агент: диоксид кремния), бета-каротин 20% (крахмал модифицированный, крахмал кукурузный, #-каротин кристаллический, сироп декстрозы, антиокислители: натрия аскорбат и DL-альфа-токоферол), антислеживающие агенты: диоксид кремния аморфный, магниевая соль стеариновой кислоты.

Форма выпуска

Таблетки покрытые оболочкой

Показания

ревматоидный артрит, несуставный ревматизм, остеоартроз, болезнь Бехтерева, болезнь Шегрена, травмы (переломы, ушибы, дисторсии, вывихи, контузии), воспалительные процессы мягких тканей, хронические посттравматические процессы, травмы в спортивной медицине, посттравматические отеки, синусит, бронхит, бронхопневмония, панкреатит, язвенный колит, болезнь Крона, рассеянный склероз, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, торичная профилактика повторного инфаркта миокарда, тромбофлебиты, посттромботический синдром, васкулиты, облитерирующий тромбангиит, профилактика рецидивирующих флебитов, лимфатический отек, вторичный лимфатический отек, воспаление мочевыводящих путей (цистит, цистопиелит, простатит), хронические инфекции в гинекологии, аднексит, мастопатии.

Способ применения и дозы

Таблетки следует принимать внутрь, не менее чем за 30 минут до еды, не разжевывая, запивая водой (200 мл). Взрослые в зависимости от активности и тяжести заболевания ВОБЭНЗИМ принимают в дозе от 3 до 10 таблеток 3 раза в день. В первые три дня приема препарата рекомендуемая доза составляет 3 таблетки 3 раза в день. При средней активности заболевания ВОБЭНЗИМ назначают в дозе 5,7 таблеток 3 раза в день в течение 2-х недель. В дальнейшем доза ВОБЭНЗИМА должна быть снижена до 3,5 таблеток 3 раза в день, курс 2 недели. При высокой активности заболевания ВОБЭНЗИМ назначают в дозе 7,10 таблеток 3 раза в день в течение 2,3 недель. В дальнейшем, доза ВОБЭНЗИМА снижается до 5 таблеток 3 раза в день, курс 2,3 месяца. При хронических длительно текущих заболеваниях ВОБЭНЗИМ может применяться по показаниям курсами от 3-х до 6-ти месяцев и более. С целью повышения эффективности антибиотиков и профилактики дисбактериоза, ВОБЭНЗИМ следует применять на протяжении всего курса антибиотикотерапии в дозе по 5 таблеток 3 раза в день. После прекращения курса антибиотиков для восстановления микрофлоры (биоценоза) кишечника ВОБЭНЗИМ следует назначать по 3 таблетки 3 раза в день в течение 2-х недель. В качестве терапии «прикрытия», во время проведения химио- и лучевой терапии, ВОБЭНЗИМ следует применять в дозе по 5 таблеток 3 раза в день до завершения курса химио- и лучевой терапии, для предупреждения инфекционных осложнений, улучшения переносимости базисной терапии и повышения качества жизни. При применении ВОБЭНЗИМА с профилактической целью доза препарата составляет 3 таблетки 3 раза в день, курс 1,5 месяца с повторением 2,3 раза в год. Дети Детям с 5-ти до 12 лет, на 6 кг веса ребенка 1 таблетка в сутки. С 12 лет по схеме для взрослых. Дозировка и длительность лечения зависят от тяжести заболевания и определяются врачом.

Противопоказания

индивидуальная гиперчувствительность к компонентам препарата, тяжелые врожденные или приобретенные нарушения свертываемости крови (гемофилия, тяжелые поражения печени), заболевания, связанные с повышенной вероятностью кровотечений, тромбоцитопения.

Применение при беременности и кормлении грудью

Беременность и грудное вскармливание не являются противопоказанием для применения препарата, однако, беременные женщины должны принимать ВОБЭНЗИМ под контролем врача.

Побочные действия

тошнота, незначительные изменения консистенции и запаха кала, аллергическая реакция, анафилактические реакции, рвота, временное ощущение переполненности желудка, метеоризм, диарея, эритема, зуд, гипергидроз.

Передозировка

Случаев передозировки препарата неизвестно.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном приеме ВОБЭНЗИМА с другими лекарствами случаи несовместимости не описаны.

Особые указания

В случае инфекционных процессов ВОБЭНЗИМ не заменяет антибиотики, но повышает их эффективность, увеличивая концентрацию в плазме крови и очаге воспаления. Следует иметь в виду, что в самом начале приема препарата симптомы заболевания могут обостряться, в таких случаях лечение прерывать не следует, а рекомендуется временное снижение дозы препарата. Препарат не является допингом.

Срок хранения после открытия

2 года

Условия хранения

В сухом темном месте