Инструкция по применению
ВольтаФлекс Таблетки 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Тайвань (Республика Китай)
Производитель: Хелеон Тайвань Консьюмер Хелс Корпорейшн, Хинчу Плант
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 30



Описание

Действие на организмФормула продукта содержит неденатурированный коллаген II типа UC-II®(1), животного происхождения, произведенный по уникальной запатентованной технологии(2), показавший действие в научных исследованиях (проведено 12 научных исследований).Неденатурированный коллаген UC-II® обладает особенным иммунным механизмом действия(3). Он направлен на настройку собственных защитных сил организма, способствует уменьшению воспалительных процессов, предотвращению разрушения хрящевой ткани и выработке собственного коллагена II типа, замедляя прогрессирование патологических процессов в суставах. Коллаген II типа UC-II® в составе БАДа ВольтаФлекс в 2,4 раза лучше поддерживает функцию суставов, чем комбинация глюкозамин + хондроитин. Клинически доказано (4).Механизм действия(5-8)Даже небольшие физические нагрузки или занятия спортом со временем могут привести к микротравмам суставов, что может привести к разрушению хрящевой ткани. Это дает сигнал иммунной системе человека к запуску агрессивного ответа против собственного коллагена II типа, что приводит к воспалению суставов.При приеме коллагена II типа попадает в неизменном нерасщепленном виде в кишечник, где встречается с клетками иммунной системы (Т и В лимфоциты). Иммунная система распознает коллаген II типа, оценивает его как безвредный, естественый субстрат, передавая информацию всему организму. Это способствует снижению активности иммунной атаки организма на собственный коллаген II типа в суставах. Воспаление в суставах постепенно уменьшается, и их разрушение замедляется.Коллаген II типа UC-II® в составе БАДа ВольтаФлекс способствует уменьшению дискомфорта в суставах и поддержанию функции суставов,

предотвращению разрушения суставных хрящей, выработке собственного коллагена II типа, улучшению двигательной активности и выносливости при физических нагрузках.(1)Неденатурированный коллаген II типа — основной структурный белок хрящевой ткани.(2)Патент №: US 11,793,217 B1 от 24.10.2023.(3)Дыдыкина И. с соавт. Медицинский совет. 2022, 16(14): 145–153.(4)На основе комплексной оценки боли, скованности, функции суставов (индекс WOMAC) в группе, принимавшей коллаген II типа UC-II® 40 мг/сут, процент снижения индекса WOMAC был в 2,4 раза выше (33%) по сравнению с группой, принимавшей комбинацию глюкозамина 1500 мг/сут и хондроитина 1200 мг/сут (14%), через 90 дней терапии. Кроули Д., 2019.(5)Луго Дж., 2013(6)Шон К., 2022.(7)Шавловская О. с соавт., 2022.(8)Садигурский Д., 2022.Свойства компонентовСвойства неденатурированного коллагена II типа (UC-II®) отличаются от денатурированного (расщепленного) коллагена(1–4). Коллаген II типа UC-II® производится по запатентованной технологии, сохраняет целостность трехмерной молекулы, что позволяет ей дойти до кишечника в неизменном виде, минуя агрессивную среду желудка. UC-II® активирует иммунную систему на борьбу с воспалением в суставе, в то время как расщепленный коллаген усваивается непредсказуемо по всему организму (в т.ч. ногти, волосы, кожа, суставы).Формула продукта усилена профилактическим комплексом витамина С и микроэлементов, наиболее важных для синтеза коллагена: цинк, медь, марганец и магний.Витамин С обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием.Марганец влияет на формирование костей и хрящей и поддерживает их структуру и функции.Медь обладает противовоспалительными свойствами, участвует в процессе восстановления тканей после травм и операций.Цинк регулирует иммунную функцию, участвует в процессе заживления ран.Магний стабилизирует костную структуру и придает костям твердость.(1)Луго Дж., 2013(2)Шон К., 2022.(3)Шавловская О. с соавт., 2022.(4) Садигурский Д., 2022.

Состав

1 таблетка содержит:активные и вспомогательные вещества: носитель МКЦ, магния оксид, витамин С (L-аскорбиновая кислота, загуститель гидроксипропилметилцеллюлоза), неденатурированный коллаген II типа UC-II® (куриный грудинный хрящ, хлорид натрия), краситель Опадрай голубой (эмульгатор гидроксипропилметилцеллюлоза, краситель диоксид титана, агент антислеживающий: тальк, стабилизатор полидекстроза, мальтодекстрин, среднецепочечные триглицериды, краситель индигокармин, краситель бриллиантовый голубой), цинка оксид, марганца сульфата моногидрат, стабилизатор кроскарамеллоза (карбоксиметилцеллюлозы натриевая соль кроссвязанная), меди сульфат безводный, агент антислеживающий: магниевые соли жирных кислот.Суточная доза (1 таблетка) содержит, мг - Витамин С - 45 - 75(1)% от рекомендуемого суточного потребления для взрослыхМедь - 0,5 - 50(2) % от рекомендуемого суточного потребления для взрослыхМарганец - 1,8 - 90(2) % от рекомендуемого суточного потребления для взрослыхЦинк - 7,5 - 50(1) % от рекомендуемого суточного потребления для взрослыхМагний - 52,5 - 13(1) % от рекомендуемого суточного потребления для взрослыхНеденатурированный коллаген II типа UC-II® (в пересчете на коллаген, не менее) - 40 (10) - (1)Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011), Приложение 2.(2)ЕврАзЭС «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиеническиетребования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», Приложение 5.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

В качестве БАДа к пище — дополнительного источника витамина С и минеральных веществ (меди, марганца и цинка), содержащего коллаген и магний.БАД к пище ВольтаФлекс рекомендуется при: занятиях спортом и при средних и интенсивных нагрузках на суставы при тренировках в зале, беге, избыточной массе тела, что приводит к повышенным нагрузкам на суставы, сидячем образе жизни (например, работе за компьютером) при недостаточной физической активности, дискомфорте в области сустава в течение 2 мес, постоянных тяжелых физические нагрузках на работе или в быту.

Способ применения и дозы

Внутрь, во время еды.Взрослым — по 1 табл. в день.Продолжительность приема: 1–3 месяца (минимально — 1 мес, полный курс — 3 мес). При необходимости курс приема можно повторить.Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта.

Применение при беременности и кормлении грудью

В период беременности и лактации перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.

Передозировка

В случае передозировки немедленно обратиться к врачу. Перед применением других БАДов следует ознакомиться с информацией на этикетке, поскольку при наличии в составе аналогичных активных ингредиентов возможно превышение суточной нормы их потребления.

Особые указания

Здоровый образ жизни и слабансированное питание важны для здоровья. Биологически активные добавки к пище не заменяют сбалансированного питания. Не превышать рекомендуемую суточную дозу.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С и относительной влажности воздуха не более 60%. Хранить в недоступном для детей месте.