Инструкция по применению
Вольтарен спрей 4% 25мл

Характеристики



Форма выпуска: Спрей
Страна: Германия
Производитель: Хелеон
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Диклофенак
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 8 мг/доза

Описание

Спрей Вольтарен оказывает противовоспалительное, анальгезирующее и жаропонижающее действие.

Действующее вещество

Диклофенак

Состав

1 доза (0,2 г) препарата содержит: диклофенак натрия 8 мг.

Форма выпуска

Спрей

Показания

Воспалительные заболевания опорно-двигательного аппарата (ревматоидный артрит, псориатический, ювенильный хронический артрит, поражения мягких тканей, подагрический артрит), травматически обусловленные воспаления сухожилий, связок, мышц и суставов (в результате растяжений, при нагрузке и ушибах). Болевой синдром (невралгия, миалгия, тендовагинит, бурсит, ревматические поражения мягких тканей, дегенеративные заболевания опорно-двигательного аппарата: деформирующий остеоартроз, остеохондроз).

Способ применения и дозы

Препарат следует наносить только на кожу. При однократном нажатии на дозирующее устройство высвобождается 0,2 г препарата (1 доза), содержащего 8 мг диклофенака. Необходимое количество препарата должно быть нанесено на участок кожи пораженного места. Препарат аккуратно втереть в кожу. Процедуру необходимо проводить три раза в день с равномерными интервалами.

Противопоказания

Гиперчувствительность к диклофенаку или к любому другому лекарственному средству из группы нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), а также к любому из вспомогательных веществ препарата, пациенты, для которых прием ацетилсалициловой кислоты или других нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) сопровождается приступами астмы, крапивницей или острым ринитом, нарушение целостности кожных покровов в месте нанесения препарата, беременность (III триместр), период лактации, детский возраст (до 15 лет).

Применение при беременности и кормлении грудью

В течение первых шести месяцев беременности не следует принимать препарат без особой необходимости и на большую площадь поверхности тела (более 600 смг). Также не рекомендуется применять препарат длительное время (более трех недель). Препарат противопоказан в последнем триместре беременности.

Побочные действия

Со стороны кожных покровов: иногда крапивница, зуд, сухость. Возможно развитие системных побочных эффектов: диспепсия, боли в области живота, отек Квинке, астма. Риск появления нежелательных побочных эффектов можно снизить, если принимать минимальные эффективные дозы препарата в максимально короткий по продолжительности период времени.

Особые указания

Следует избегать контактов с глазами и слизистыми оболочками, равно как и перорального приёма препарата, применять только на нповрежденные участки кожи, участок кожи с нанесенным препаратом не рекомендуется подвергать чрезмерному воздействию солнечных лучей во избежание появления фотосенсибилизации, прием препарата необходимо немедленно прекратить при появлении кожной сыпи, не использовать совместно с герметичной одеждой и повязками, препарат содержит пропиленгликоль и мяты перечной масло, что может вызвать раздражение кожи и аллергические реакции.