Инструкция по применению
Вормин Таблетки 100 мг 24 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Индия
Производитель: Cadila Pharmaceuticals
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Мебендазол
Количество в упаковке: 24
Дозировка действующего вещества: 100 мг

Описание

Противогельминтное средство

Действующее вещество

Мебендазол

Состав

Активное вещество: мебендазол 100 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Практически не абсорбируется из ЖКТ. Связывание с белками плазмы составляет 90%. Неравномерно распределяется в органах, накапливается в жировой ткани, печени, личинках гельминтов. В печени метаболизируется до 2-аминопроизводного. T1/2 – 2.5-5.5 ч. Более 90% дозы выделяется с калом в неизмененном виде. Всосавшаяся часть (5-10%) выводится почками.

Показания

Энтеробиоз, аскаридоз, анкилостомидоз, стронгилоидоз, трихоцефалез, трихинеллез, тениоз, эхинококкоз, смешанные гельминтозы.

Способ применения и дозы

Внутрь, с небольшим количеством воды.Энтеробиоз взрослым и детям старше 10 лет — 100 мг, однократно, детям 2–10 лет — 25–50 мг, однократно. В случае высокой вероятности повторной инвазии — повторно через 2–4 нед в той же дозе. Аскаридоз, трихоцефалез, анкилостомоз, тениоз, стронгилоидоз и смешанные гельминтозы — по 100 мг утром и вечером в течение 3 дн. Трихонеллез — по 200–400 мг 3 раза в сутки в течение 3 дней, а с 4 по 10 день — по 400–500 мг 3 раза в сутки. Эхинококкоз — по 500 мг 2 раза в сутки в первые 3 дня, в последующие 3 дня дозу увеличивают до 500 мг 3 раза в сутки, в дальнейшем дозу повышают до максимальной (из расчета 25–30 мг/кг/сут) и принимают в 3–4 приема.

Противопоказания

Выраженные нарушения функции печени, беременность, лактация (грудное вскармливание), детский возраст до 2 лет, повышенная чувствительность к мебендазолу.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано

Побочные действия

Со стороны пищеварительной системы: редко - тошнота, боли в животе, при применении в высоких дозах в течение длительного времени возможны рвота, диарея, транзиторное повышение активности печеночных трансаминаз в сыворотке крови.Со стороны ЦНС: редко - головокружение, при применении в высоких дозах в течение длительного времени - головная боль.Со стороны системы кроветворения: при применении в высоких дозах в течение длительного времени возможны лейкопения, анемия, эозинофилия.Со стороны мочевыделительной системы: при применении в высоких дозах в течение длительного времени - гематурия, цилиндрурия.

Передозировка

Симптомы: боль в животе, тошнота, рвота, диарея. При применении в высоких дозах в течение длительного времени: обратимые нарушения функции печени, гепатит, нейтропения. Лечение :необходимо удалить препарат из желудка, вызвав рвоту или сделав промывание желудка, прием активированного угля.

Взаимодействие с другими препаратами

Снижает потребность в инсулине у больных сахарным диабетом. Следует избегать совместного назначения с липофильными веществами. Циметидин может повышать концентрацию в крови, карбамазепин и др. индукторы метаболизма - снижать.

Особые указания

При длительном применении Вормина необходимо контролировать картину периферической крови, функции печени и почек. В течение суток после приема мебендазола не допускать употребления алкоголя.

Условия хранения

Беречь от детей, при комнатной температуре