Инструкция по применению
Вожея Таблетки 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Италия
Производитель: Си Эс Си
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 30



Описание

Вожея® - это уникальный комплекс пирофосфата железа Lipofer® и фолиевой кислоты Quatrefolic®.Микрокапсулы Lipofer — это легкоусвояемая форма неионизированного железа в виде липосом.Липосомы способствуют полноценному усвоению железа не-посредственно в тонком кишечнике, скрывают металлический вкус железа, защищают слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта.Липосомы нетоксичны, лишены антигенных свойств, надежно укрывают свое содержимое (пирофосфат железа) от агрессивного воздействия желудочного сока и не подвергаются атаке со стороны иммунной системы. Такая технология способствует доставке железа в костный мозг.Это принципиально новый механизм транспортировки железа. Имеются данные о том, что применение именно липосомной формы повышает уровень гемоглобина. Важно, что липосомальное железо не раздражает слизистые оболочки желудочно- кишечного тракта, а его всасывание происходит в двенадцати-перстной кишке и на протяжении всего тонкого кишечника. Фолиевая кислота в составе Вожеи® представлена в виде нового поколения Quatrefolic - глюкозаминовой соли (65)-5-метилтетрагидрофолата, в настоящее время наиболее биологически доступной формы фолата, демонстрирующей повышенную устойчивость и растворимость в воде. Например, ее растворимость в 100 раз выше, чем у кальциевой соли. А это означает, что Quatrefolic® лучше усваивается организмом и восполняет дефицит фолиевой кислоты.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует назначать беременным женщинам пероральные добавки с содержанием 30-60 мг элементарного железа и 400 мкг (0,4 мг) фолиевой кислоты ежедневно для профилактики анемии, после-родового сепсиса, рождения

маловесного ребенка и преждевременных родов. Прием фолиевой кислоты должен начинаться как можно раньше (по возможности, до зачатия) для профилактикиЖелезодефицитные состояния (ЖДС) у женщин наблюдаются в любом возрасте (с раннего детства до периода менопаузы). Обычно этому предшествует длительный период скрытого железодефицита, когда большинство лабораторных показателей остаются нормальными, но запас железа уже истощен.В детородном возрасте эта состояния выявляются у 40-60% женщин, что является одной из причин развития ЖДС при беременности. ЖДС встречаются на любом сроке у беременных и обусловлены повышенным потреблением железа матерью и плодом на фоне его недостаточного поступления и/или усвоения. Дефицит железа у беременных неблагоприятно отражается на течении беременности, родов, послеродового периода, состоянии плода и новорожденного, способствуя увеличению частота) угрозы прерывания беременности, плацентарной недостаточности, задержки внутриутробного развитая и гипоксии плода. С дефицитом железа связаны патологические кровопотери при родах и в раннем послеродовом периоде, инфекционные осложнения и недостаточность выработки грудного молока у родильниц. Кроме того, дефицит железа в различные периоды беременности является одной из причин развитая ЖДС и анемии у грудных детей, а также их отставания в психомоторном и умственном развитии на первых годах жизни.Фолиевая кислота (фолат, витамин В9) - это водорастворимый витамин группы «В», содержащийся в таких продуктах питания, как печень, почки, дрожжи, зеленые листовые овощи. Незаменимый кофактор для ферментов, вовлеченных в синтез ДНК и РНК. В присутствии фолиевой кислота) синтезируются пурины, пиримидины и метионин перед тем, как встроиться в ДНК или белок.Фолиевая кислота и ее быстроусвояемая форма металтетрагидрофолат обеспечивают потребности женского организма на всех этапах беременности и кормления.Фолиевая кислота используется для лечения состояний фолиевого дефицита, при мегалобластной анемии и алиментарных анемиях, при беременности, у детей (в т.ч. грудных), а также для профилактики врожденных дефектов развития нервной трубки. Потребность в фолиевой кислоте особенно высока в периоды быстрого клеточного деления, например у новорожденных и грудных детей, во время беременности, в процессе эритропоэза.

Состав

Lipofer микрокапсулы* (кукурузный крахмал с прослеживаемым происхождением, железа пирофосфат, лецитин подсолнечника), микрокристаллическая целлюлоза (E460, носитель), моно- и диглицериды жирных кислот (E471, стабилизатор), карбоксиметилцеллюлоза натриевая соль кроссвязанная (E468, стабилизатор), поливинилполипирролидон (E1202, стабилизатор), магниевые соли жирных кислот (E470b, антислеживающий агент), диоксид кремния (E551, антислеживающий агент), Quatrefolic** [(6S)-5-метилтетрагидрофолиевой кислоты, глюкозаминовая соль]. *Lipofer является торговой маркой компании Lipotec S. A.** Quatrefolic является зарегистрированной торговой маркой компании Gnosis S.p.A.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище - дополнительного источника железа и фолиевой кислоты.

Способ применения и дозы

Рекомендации по применению:Женщинам, планирующим беременность, в период беременности и кормления грудью по 1 таблетке 1 раз в день во время еды.Взрослым - по 1 таблетке 1 раз в день во время еды.Запивать достаточным количеством воды (200-250 мл).Не превышать установленной рекомендуемой дозы.Продолжительность приема - 1 месяц, с последующим повторением по рекомендации врача.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов. Не рекомендуется лицам до 18 лет. Перед приемом рекомендуется проконсультироваться с врачом. Беременным и кормящим женщинам принимать по рекомендации и под наблюдением врача.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищённом от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.