
Инструкция по применению
Вука Лонг Таблетки покрытые оболочкой массой 1600 мг 60 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Чехия
Производитель: Walmark, a.s.
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Вука Лонг - Биологически активная добавка (БАД) к пище - является сбалансированной комбинацией веществ, способных подавлять нейросенсорные факторы развития преждевременной эякуляции. Кроме того, применение Вука Лонг улучшает сексуальную функцию в целом, улучшает общее самочувствие (помогает снизить уровень тревожности) и повышает яркость оргастических ощущений. Содержание в суточной норме потребления (4 таблетки, покрытые оболочкой, массой 1600 мг): Витамин B6 - 0,68 мг. Магний - 128 мг. L-изолейцин - 1140 мг. L-глутамин - 156 мг. L-тирозин - 1320 мг. L-триптофан - 240 мг. Преждевременная эякуляция является самой распространенной сексуальной проблемой: в среднем ею страдают около 30% сексуально-активных мужчин во всем мире. Преждевременная эякуляция проявляется невозможностью контролировать эякуляцию в той мере, которая была бы достаточна, чтобы оба партнера получили удовлетворение от полового акта. Нарушение действия серотонина в головном мозге является ведущей (так называемой, нейросенсорной) причиной первичной и истинной вторичной преждевременной эякуляции. Известно, что большое количество серотонина в головном мозге позволяет удлинять продолжительность полового акта, в то время как низкое количество серотонина создает условия для преждевременной эякуляции. Вука Лонг может применяться в качестве биологически активной добавки к пище, способствующей: увеличению длительности секса; усилению яркости оргазма (при стертости оргазма); улучшению сексуальной функции. Действие компонентов Вука Лонг имеет накопительный эффект - улучшение продолжительности полового акта и качества оргазма появляются постепенно. Курс

можно повторять через каждые 2 месяца. Активные ингредиенты: L-изолейцин: Незаменимая аминокислота, которая благодаря своей разветвленной структуре участвует в энергетическом обмене, протекающем в организме. Ее основными функциями являются: увеличение физической и психической выносливости человека; обеспечение мышечных тканей энергией; предотвращение чувства беспокойства, тревоги, страха; стабилизация уровня сахара в крови и процессов энергообеспечения; восстановление мышечной ткани; выработка гемоглобина; регулирование синтеза серотонина. L-глутамин: L-глутамин является самой распространенной условно незаменимой (синтез ограничен) аминокислотой человеческого организма. Необходим для образования ряда важных витаминов, эффективного роста мышц, обеспечения нервной деятельности и поддержания иммунной системы. Способствует синтезу серотонина, необходимого для обеспечения нормальной продолжительности полового акта. Прием L-глутамина активизирует умственную деятельность и самоконтроль, помогает концентрировать внимание, улучшает память и настроение, является антистрессовым фактором. L-тирозин: Аминокислота в виде активной формы (L-изомера), входящая в состав множества природных белков и ферментов. L-тирозин является предшественником синтеза ряда важных биологически активных веществ, в том числе катехоламинов (дофамин, адреналин, норадреналин) и тиреоидных гормонов. L-тирозин активирует работу центров удовлетворённости, уменьшает проявление депрессии, стресса и повышает настроение. Особенно потребность в L-тирозине возрастает при повышенных психологических, эмоциональных и физических нагрузках. L-триптофан: Незаменимая аминокислота (не синтезирующаяся в организме человека и выполняющая важнейшую роль в сборке ряда белков) в виде активной формы (L-изомера). В ходе обменных реакций в желудочно-кишечном тракте L-триптофан непосредственно преобразуется в серотонин ? соединение, которое имеет важнейшее значение для обеспечения длительности полового акта. Кроме того, регулярный прием L-триптофана вызывает умственное расслабление и создает ощущение эмоционального благополучия, снижает тревожность, поднимает настроение, понижает чувство напряжения и страха, улучшает сон, в эксперименте уменьшает тягу к еде, особенно углеводной, ослабляет выраженность проявлений синдрома отмены при никотиновой зависимости и алкоголизме. L-триптофан необходим для синтеза мелатонина, участвующего в регуляции биоритмов человека. Витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид): Данный витамин иногда называют «королем обмена аминокислот». Витамин B6 необходим для синтеза серотонина. Витамин B6 проявляет синергию в сочетании с L-глутамином и L триптофаном в отношении данного процесса. Именно серотонин имеет важное значение для обеспечения достаточной продолжительности полового акта. Витамин B6, являясь катализатором обмена аминокислот и синтеза большинства нейромедиаторов нервной системы, улучшает метаболизм в тканях головного мозга,

участвует в равномерном снабжении клеток глюкозой. Таким образом, витамин B6 повышает работоспособность мозга, способность контролировать длительность полового акта, улучшает память и настроение. Витамин B6 необходим для регуляции обмена L-тирозина. Магний: Важнейший микроэлемент для организма человека, являющийся структурным компонентом около 300 ферментов, в том числе важным составляющим для биосинтеза белков, а также служащий для обеспечения процессов возбудимости и сократимости в нервных элементах мышечной ткани. Являясь регулятором прохождения избыточных нервных импульсов от головного мозга к периферическим нервам и мышцам, магний предотвращает избыточные спазмы (непроизвольные сокращения мышц), в том числе и в половой системе. Тормозя процессы возбуждения в центральной системе, магний вызывает снижение реакции организма на внешние раздражители и является важным антистрессовым компонентом. Доказано, что недостаток магния в съедаемой пище является важным фактором развития преждевременной эякуляции. Следует учитывать, что особенно потребность в магнии увеличивается под действием повышенных психологических, эмоциональных и физических нагрузок. Магний обладает эффектом синергизма с витамином B6, т.е. данные вещества при одновременном приеме проявляют более выраженную эффективность и в более низких дозах, чем при употреблении по отдельности.

Состав

L-тирозин, L-изолейцин, наполнитель орто-фосфат кальция 2замещенный, магний (цитрат магния), антислеживающий агент целлюлоза микрокристаллическая, стабилизатор карбоксиметилцеллюлоза натриевая соль кроссвязанная, оболочка таблетки (стабилизатор гидроксипропилметилцеллюлоза, антислеживающий агент тальк, стабилизатор гидроксипропилцеллюлоза, краситель концентрат шафрана и лимона, пеногаситель полиэтиленгликоль, антислеживающий агент стеариновая кислота, краситель кармин, краситель оксид железа желтый), L-триптофан, стабилизатор крахмал, обработанный щелочью, L-глутамин, антислеживающий агент магниевая соль стеариновой кислоты, витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид).

Форма выпуска

Таблетки

Показания

В качестве биологически активной добавки к пище - дополнительного источника витамина B6, магния, источника изолейцина, глутамина, тирозина, триптофана.

Способ применения и дозы

Взрослым мужчинам по 2 таблетки 2 раза в день во время приема пищи. Продолжительность приема - 1 месяц. Рекомендуется повторять курс приема 3-4 раза в год.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта.

Особые указания

БАД. Не является лекарственным средством.

Условия хранения

Хранение в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре не выше +25°C.