Инструкция по применению
Вулнузан Мазь для местного и наружного применения 45 г

Характеристики



Форма выпуска: Мазь
Страна: Болгария
Производитель: Софарма
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: маточный щелок Поморийского озера
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 24

Действующее вещество

маточный щелок Поморийского озера

Состав

1 г мази наружного применения содержит: Активное вещество: маточный щелок Поморийского озера 120 мг; Вспомогательные вещества: масло касторовое, тилоза С-30, ланолин безводный, вода дистиллированная.

Форма выпуска

Мазь

Показания

Варикозные язвы, трещины сосков молочной железы, эрозия шейки матки, изъязвления, возникающие при болезни Бюргера; Медикаментозные естественные обратимые изменения эпидермиса кожи (мацерация); Гнойные раны различного происхождения: хирургические, инфицированные; Поверхностные гнойные процессы (включая постинъекционные и параректальные абсцессы), раны атеросклеротического и посттравматического характера, трофические язвы.

Способ применения и дозы

Мазь наносят слоем толщиной 2-3 мм на всю раневую поверхность и покрывают сверху стерильной повязкой. При лечении абсцессов с большой полостью используют до 10-15 г мази. В начале курса лечения повязки меняют ежедневно, при улучшении состояния раны - через день. При лечении трещин соска молочной железы мазь наносят на область трещины несколько раз в день после кормления ребенка. При лечении эрозии шейки матки тампон с нанесенным на него препаратом вводят во влагалище 1 раз/ вечером в течение 10-15 дней.

Противопоказания

Беременность; детский возраст до 12 лет; повышенная чувствительность к компонентам препарата Вулнузан.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказан при беременности. Назначение препарата в период лактации возможно по показаниям. Применение препарата не мешает кормлению ребенка и не требует прекращения грудного вскармливания.

Побочные действия

Аллергические реакции: кожная сыпь; крапивница; ангионевротический отек. Местные реакции: боль при нанесении на язвы.

Передозировка

Случаев передозировки при применении препарата не зарегистрировано.

Особые указания

При необходимости можно применять окклюзионные повязки. Лекарственный препарат содержит ланолин который может вызвать местные кожные реакции (например контактный дерматит). Клещевины обыкновенной семян масло (касторовое масло) при местном применении может вызвать кожные реакции. Натрия бензоат может вызвать слабое раздражение при попадании в глаза и на слизистые оболочки а гак же может вызвать слабое раздражение кожи. Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.: Применение препарата не влияет на способность к управлению транспортными средствами и занятию потенциально опасными видами деятельности требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Срок хранения после открытия

Срок годности после вскрытия тубы: 1 месяц.

Условия хранения

В сухом защищенном от света месте при температуре не выше 25° С. Хранить в недоступном для детей месте!