Инструкция по применению
Залаин Крем для наружного применения 2 % 20 г

Характеристики

Форма выпуска: Крем
Страна: Венгрия
Производитель: Эгис
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Сертаконазол
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 2%
Срок годности: 36

Описание

Белый мягкий крем, без запаха или со слабым запахом жира.

Действующее вещество

Сертаконазол

Состав

1 г крема содержит 20 мг действующего вещества сертаконазола нитрата, а также вспомогательные вещества: макрогола и этиленгликоля пальмитостеарат, полигликолизированные насыщенные глицериды, глицерин изостеарат, парафин жидкий, метилпарагидроксибензоат (нипагин), сорбиновая кислота, вода очищенная.

Форма выпуска

Крем

Фармакокинетика

При местном применении сертаконазол нитрат в крови и моче не обнаруживаются.

Показания

Местное лечение поверхностных микозов кожи: дерматомикозов, Tinea pedis (стопа атлета), Tinea crusis, Tinea corporis, Tinea barbae (микоз бороды), Tinea manus, кандидоза (Monolisiasis), Pityiriasis versicolor (Pityrosporum orbiculare).

Способ применения и дозы

Крем наносят на пораженные участки кожи равномерным тонким слоем дважды в день с захватом примерно 1 см поверхности здоровой кожи. Продолжительность лечения зависит от этиологии возбудителя и локализации инфекции. Как правило, симптомы заболевания исчезают через 2-4 недели. Рекомендуемая длительность лечения - 4 недели.

Противопоказания

Гиперчувствительность к противогрибковым средствам (производным имидазола) или вспомогательным веществам крема. При появлении каких-либо раздражений или аллергических реакций немедленно прекратить использование.

Применение при беременности и кормлении грудью

У беременных женщин безопасность препарата специально не изучалась. Поэтому применение сертаконазола во время беременности возможно, если потенциальная польза для матери превосходит возможный риск для плода.

Побочные действия

Контактный дерматит. Возможны быстро проходящие местные эритематозные реакции, что не требует отмены препарата.

Передозировка

Учитывая наружный способ применения, передозировка препаратом Залаин маловероятна. При случайном приеме препарата внутрь необходимо провести симптоматическое лечение.

Взаимодействие с другими препаратами

Взаимодействия не выявлено.

Условия хранения

Беречь от детей