Инструкция по применению
Залдиар Таблетки 50 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Германия
Производитель: Грюненталь
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Парацетамол + Трамадол
Количество в упаковке: 50
Срок годности: 36

Описание

Капсуловидные, двояковыпуклые таблетки, покрытые плёночной оболочкой светло-жёлтого цвета, на одной стороне гравировка "Т 5", на другой - "Ω". На поперечном разрезе ядро почти белого цвета.

Действующее вещество

Парацетамол + Трамадол

Состав

Действующие вещества: Парацетамол 325,000 мг, трамадола гидрохлорид 37,500 мг. _Вспомогательные вещества:_ Целлюлоза порошкообразная, крахмал прежелатинизированный, карбоксиметилкрахмал натрия (тип А), крахмал кукурузный, магния стеарат; _Вспомогательные вещества(оболочка)_: гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза 6 мПа с), лактозы моногидрат, титана диоксид, макрогол-6000, краситель железа оксид желтый, пропиленгликоль, тальк.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Болевой синдром средней и высокой интенсивности различной этиологии (при необходимости комбинированной терапии трамадолом и парацетамолом).

Противопоказания

\- Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата; \- острая интоксикация алкоголем; снотворными препаратами; \- наркотическими анальгетиками; опиоидами и психотропными препаратами; \- одновременное применение ингибиторов моноаминоксидазы (МАО) и в течение двух недель после их отмены; \- тяжелая печёночная недостаточность; \- тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина <10 мл/мин); \- детский возраст до 12 лет (специальных исследований по оценке эффективности и безопасности Залдиара® в данной возрастной группе не проводилось); \- эпилепсия, не контролируемая лечением; \- непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Относится к списку сильнодействующих веществ, подлежащих контролю в Российской Федерации. Хранить в недоступном для детей месте.