Инструкция по применению
Зантак шипучие таблетки 150мг N15

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Германия
Производитель: Хелеон
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Ранитидин
Количество в упаковке: 15
Дозировка действующего вещества: 150 мг



Действующее вещество

Ранитидин

Состав

В 1 мл: ранитидин (в форме гидрохлорида) 150 мг. Вспомогательные вещества: натрия моноцитрат безводный, натрия гидрокарбонат, аспартам, повидон К30, натрия бензоат, ароматизатор апельсиновый, грейпфрутовый ароматизатор.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

— язвы двенадцатиперстной кишки и доброкачественные язвы желудка, в т.ч. связанные с приемом НПВС . — профилактика язв двенадцатиперстной кишки, вызванных НПВС (включая ацетилсалициловую кислоту), особенно у пациентов с язвенной болезнью в анамнезе . — язвы двенадцатиперстной кишки, связанные с инфицированием Helicobacter pylori . — послеоперационные язвы . — гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь . — рефлюкс-эзофагит . — купирование болевого синдрома при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни . — синдром Золлингера-Эллисона . — хроническая эпизодическая диспепсия, характеризующаяся эпигастральными или загрудинными болями, которые связаны с приемом пищи или нарушают сон, но не относятся к вышеперечисленным состояниям . — профилактика стрессовых язв желудка у тяжелобольных пациентов . — профилактика рецидивов кровотечения из пептических язв . — профилактика синдрома Мендельсона (аспирация кислотного содержимого желудка во время наркоза).

Противопоказания

— острая порфирия (в т.ч. в анамнезе) . — беременность . — период лактации (грудное вскармливание) . — детский возраст до 12 лет . — повышенная чувствительность к ранитидину и другим компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Ранитидин проникает через плаценту и выделяется с грудным молоком (концентрация в грудном молоке выше чем в плазме). Применение препарата при беременности возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. При необходимости назначения препарата в период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.