# Инструкция по применению
# Женьшеня Настойка ТФФ 25 мл

## Характеристики

Форма выпуска: Настойка
Страна: Россия
Производитель: Тульская ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Женьшень
Количество в упаковке: 1




## Описание

Настойка женьшеня - общетонизирующее средство растительного происхождения.

## Действующее вещество

Женьшень

## Состав

Выпускают спиртовую настойку, главным действующим веществом которой является корень женьшеня.

## Форма выпуска

Настойка

## Показания

Артериальная гипотензия (пониженное артериальное давление), астенический синдром, физическое и психическое переутомление, неврастенический синдром, период реконвалесценции после перенесенных длительных и тяжелых, в том числе инфекционных, заболеваний, нейро-циркуляторная дистония по гипотоническому типу, в комплексной терапии при ослабленной половой функции на почве неврастении.

**Способ применения и дозы**

Внутрь за 30-40 минут до еды по 15-20 капель 2-3 раза в день. Курс лечения 30-40 дней. Целесообразность проведения повторного курса определяется врачом.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, артериальная гипертензия (повышенное артериальное давление), повышенная возбудимость, эпилепсия, судорожные состояния, расстройства сна, острые инфекционные заболевания, кровоточивость, хронические заболевания печени, беременность, период лактации, детский возраст (до 12 лет).

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Противопоказно

**Побочные действия**

Аллергические реакции, тахикардия, головная боль, нарушения сна, повышение артериального давления и гипогликемия

**Передозировка**

Симптомы: головокружение, тошнота, рвота, повышение температуры тела, нарушение дыхания, потеря сознания. Характерным симптомом интоксикации является кровоточивость, в том числе проявляющаяся кровавой рвотой и поносом. Лечение: специфический антидот отсутствует. Проводится промывание желудка, назначается активированный уголь, большое количество жидкости, симптоматическая терапия. После проведения неотложных мероприятий, больные нуждаются в медицинском наблюдении.

**Взаимодействие с другими препаратами**

Женьшеня настойка усиливает действие психостимуляторов, анальгетиков, кофеина, камфары, фенамина и других стимуляторов центральной нервной системы. Препарат является физиологическим антагонистом барбитуратов, поэтому их совместное применение нерационально. Усиливает эффект гипогликемических лекарственных средств. Усиливает действие варфарина. Повышает риск развития резистентности к петлевым диуретикам.

**Особые указания**

С целью предупреждения бессонницы не рекомендуется принимать настойку женьшеня во второй половине дня. По отзывам настойка женьшеня наиболее эффективна в осенне-зимний период.