Инструкция по применению
Женьшеня Настойка 25 мл

Характеристики



Форма выпуска: Настойка
Страна: Россия
Производитель: Вифитех
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Женьшень
Количество в упаковке: 1

Описание

Жидкость желтоватого цвета, своеобразного запаха.

Действующее вещество

Женьшень

Состав

Для приготовления 1000 мл настойки необходимо: Корни женьшеня - 100,0 г Спирт этиловый (этанол) 70 % - достаточное количество до получения 1 л настойки.

Форма выпуска

Настойка

Показания

Артериальная гипотензия (пониженное артериальное давление), астенический синдром, физическое и психическое переутомление, неврастенический синдром, период реконвалесценции после перенесенных длительных и тяжелых, в том числе инфекционных, заболеваний, нейроциркуляторная дистония по гипотоническому тину, в комплексной терапии при ослаблении половой функции на почве неврастении, для повышения работоспособности и сопротивляемости организма.

Способ применения и дозы

Внутрь. Взрослым и детям старше 12 лет за 30-40 мин до еды по 15-25 кап 2-3 раза в день. Курс лечения 30-40 дней. Целесообразность проведения повторного курса определяется врачом.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, артериальная гипертензия, повышенная возбудимость, эпилепсия, судорожные состояния, бессонница, лихорадочный синдром на фоне острых инфекционных заболеваний, кровоточивость, хронические заболевания печени, детский возраст (до 12 лет).

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата во время беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Побочные действия

Аллергические реакции, тахикардия, головная боль, нарушение сна, повышение артериального давления, гипогликемия.

Передозировка

При превышении рекомендуемых доз возможно усиление дозозависимых побочных эффектов. Симптомы: повышение артериального давления, бессонница, носовое кровотечение, сыпь на теле, повышение температуры тела. Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Усиливает действие психостимуляторов и аналептиков (в том числе кофеина, камфоры и др). Проявляет антагонизм при взаимодействии с лекарственными средствами, угнетающими центральную нервную систему, (противоэпилептические препараты, нейролептики, транквилизаторы и седативные средства). Усиливает эффект гипогликемических лекарственных средств. Усиливает действие варфарина. Повышает риск развития резистентности к петлевым диуретикам.

Особые указания

Для предупреждения бессонницы следует избегать приема во второй половине дня. Имеется четко выраженная сезонность действия: применение осенью и зимой наиболее эффективно. В максимальной суточной дозе препарата содержится 0,7 г абсолютного этилового спирта, в максимальной разовой дозе - 0,23 г абсолютного спирта.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:В период лечения необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортным: средствами и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре от 8 до 15 °С. Хранить в недоступном для детей месте.