Инструкция по применению
Женьшеня Настойка 25 мл

Характеристики



Форма выпуска: Настойка
Страна: Россия
Производитель: Ивановская Фармацевтическая Фабрика
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Женьшень
Количество в упаковке: 1

Описание

Прозрачная жидкость от желтоватого до желтого цвета с характерным запахом.

Действующее вещество

Женьшень

Состав

Активный компонент: Женьшеня настоящего корни - 100 г Вспомогательное вещество: Этанол (спирт этиловый) 70% - достаточное количество до получения 1000 мл настойки.

Форма выпуска

Настойка

Показания

Астенический синдром, физическое и психическое переутомление, неврастенический синдром, период выздоровления после перенесенных заболеваний, нейроциркуляторная дистония по гипотоническому типу.

Способ применения и дозы

Внутрь за 30-40 минут до еды по 15-20 капель 2-3 раза в день. Курс лечения 30-40 дней. Целесообразность проведения повторного курса определяется врачом.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, артериальная гипертензия (повышенное артериальное давление), повышенная возбудимость, эпилепсия, судорожные состояния, расстройства сна, острые инфекционные заболевания, повышенная кровоточивость, лихорадочный синдром на фоне острых респираторных заболеваний, хронические заболевания печени, беременность, период лактации, детский возраст (до 12 лет).

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата во время беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Побочные действия

Аллергические реакции, тахикардия, головная боль, нарушение сна, носовое кровотечение, повышенная нервозность, боли в области живота, тошнота, рвота, диарея, повышение артериального давления и гипогликемия.

Передозировка

При превышении рекомендуемых доз возможно усиление побочных эффектов, носовое кровотечение. Лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Усиливает действие психостимуляторов и аналептиков (в т.ч. кофеина, камфоры и др.). Проявляет антагонизм при взаимодействии с лекарственными средствами, угнетающими центральную нервную систему (противоэпилептические препараты, нейролептики, транквилизаторы и седативные средства). Усиливает действие гипогликемических лекарственных средств. Усиливает действие варфарина. Повышает риск развития резистентности к петлевым диуретикам.

Особые указания

Препарат не следует применять во второй половине дня во избежание нарушения сна. Имеется четко выраженная сезонность действия: применение осенью и зимой наиболее эффективно. В максимальной суточной дозе препарата содержится 0,7 г абсолютного этилового спирта, в максимальной разовой дозе - 0,23 г абсолютного этилового спирта. Если слабость, усталость наблюдаются продолжительное время и вызваны неясными причинами, следует обратиться к врачу. В период лечения необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре от 8 до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.