Инструкция по применению
Зинцет Таблетки 10 мг 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Индия
Производитель: Юникем
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Цетиризина гидрохлорид
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 10 мг

Описание

Продолговатые, двояковыпуклые, белые, покрытые пленочной оболочкой таблетки с риской на одной стороне.

Действующее вещество

Цетиризина гидрохлорид

Состав

1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит активного вещества цетиризина гидрохлорид 10 мг. Вспомогательные вещества: лактоза, крахмал кукурузный, повидон, магния стеарат, эудрагит, макроголь 6000, титана диоксид, тальк очищенный, ацетон, изопропиловый спирт, дихлорметан, вода очищенная.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Симптоматическое лечение аллергического ринита и конъюнктивита (включая круглогодичный и сезонный), сенная лихорадка (поллиноз), идиопатическая крапивница и другие аллергические дерматозы, сопровождающиеся зудом и высыпаниями.

Способ применения и дозы

Препарат Зинцет применяется по назначению врача во избежание осложнений. Дети от 2-х до 6-ти лет: 2,5 мг (1/2 чайной ложки сиропа) дважды в день или 5 мг (1 чайная ложка сиропа) один раз в день. Дети от 6 до 12 лет: по 10 мг цетиризина (1 таблетка или 2 чайных ложки сиропа) один раз в сутки или по 5 мг цетиризина (1/2 таблетки или одна чайная ложка сиропа) два раза в сутки, утром и вечером. Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет: по 10 мг цетиризина (1 таблетка или две чайных ложки сиропа) один раз в сутки. Лицам пожилого возраста или пациентам с выраженными нарушениями функции печени и/или почек препарат назначается врачом индивидуально, в уменьшенной дозе. При случайном пропуске времени приема препарата, очередную дозу следует принять при первой же возможности. В том случае, если приближается время очередного приема препарата, дозу следует принять по графику, не увеличивая общей дозы. Препарат Зинцет можно принимать вне зависимости от времени приема пищи. Таблетки, покрытые оболочкой, следует проглатывать целиком, запивая небольшим количеством воды.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к цетиризину и другим составляющим компонентам препарата, гидроксизину.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат не рекомендуется назначать женщинам в период беременности и лактации.

Побочные действия

Обычно препарат Зинцет переносится хорошо. В отдельных случаях возможны побочные эффекты в виде головной боли, сонливости, головокружения, возбуждения, сухости во рту, нарушений со стороны желудочно-кишечного тракта в виде диспепсии, боли в животе, метеоризма. В виде исключения возможно появление признаков повышенной чувствительности к препарату (крапивница, отек, одышка). В этом случае лечение препаратом следует немедленно прекратить и срочно обратиться к врачу. Необходимо сообщать врачу о всех побочных (необычных) эффектах, в том числе, не указанных в настоящей инструкции.

Передозировка

Прием препарата однократно в дозе свыше 5 таблеток может сопровождаться признаками интоксикации в виде сонливости, у детей передозировка препаратом может сопровождаться беспокойством и повышенной раздражительностью, возможно появление признаков антихолинергического действия в виде задержки мочи, сухости во рту, запора. При появлении симптомов передозировки (особенно у детей) прием препарата следует прекратить, необходимо очистить желудок, принять активированный уголь, немедленно обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими препаратами

Не рекомендуется без консультации врача сочетать прием препарата Зинцет с другими лекарственными средствами. При одновременном приеме с бронхолитическими средствами, содержащими в качестве действующего вещества теофиллин, возможно увеличение частоты побочных эффектов препарата Зинцет Данных о взаимодействии цетиризина с алкоголем до настоящего времени не получено, несмотря на это, употребление спиртных напитков при лечении препаратом Зинцет не рекомендуется.

Особые указания

Необходимо соблюдать осторожность при назначении препарата лицам, осуществляющим деятельность, которая требует высокой скорости психических и физических реакций (например, управление транспортными средствами, обслуживание машин, работа на высоте), пациентам с нарушением функции печени и /или почек и лицам пожилого возраста.

Срок хранения после открытия

3 года

Условия хранения

При температуре не выше 30 °С в сухом месте.