Инструкция по применению
Зитролид капсулы 250мг N6

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Валента Фарм
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Азитромицин
Количество в упаковке: 6
Дозировка действующего вещества: 250 мг

Описание

Состав Азитромицин 250 мг Вспомогательные вещества: магния стеарат, целлюлоза микрокристаллическая. Состав оболочки капсул: желатин, титана диоксид, хинолиновый желтый, азорубин, понсо 4R. Фармакологическое действие Антибиотик группы макролидов, является представителем подгруппы азалидов. Обладает широким спектром противомикробного действия. При создании в очаге воспаления высоких концентраций оказывает бактерицидное действие. Препарат активен в отношении грамположительных кокков: Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, стрептококков групп C, F и G, Streptococcus viridans, Staphylococcus aureus . грамотрицательных бактерий: Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Helicobacter pylori, Legionella pneumophila, Haemophilus ducreyi, Campylobacter jejuni, Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis . анаэробных микроорганизмов: Bacteroides bivius, Clostridium perfringens, Peptostreptococcus spp. Активен также в отношении: Chlamydia trachomatis, Mycoplasma pneumoniae, Ureaplasma urealyticum, Treponema pallidum, Borrelia burgdoferi. Зитролид не активен в отношении грамположительных бактерий, устойчивых к эритромицину. Способ применения и дозы Зитролид и Зитролид Форте принимают внутрь 1 раз/сут за 1 ч до еды или через 2 ч после приема пищи. Взрослым при инфекциях верхних и нижних отделов дыхательных путей назначают 500 мг/сут в течение 3 дней . курсовая доза составляет 1.5 г. При инфекциях кожи и мягких тканей назначают 1 г в 1-й день и по 500 мг ежедневно со 2-го по 5-й день (курсовая доза - 3 г). При острых инфекциях мочеполовой системы (неосложненный уретрит или цервицит) назначают однократно

1 г. При болезни Лайма (боррелиозе) для лечения I стадии (erythema migrans) назначают 1 г в 1-й день и по 500 мг ежедневно со 2-го по 5-й день (курсовая доза - 3 г). При язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, ассоциированной с Helicobacter pylori, препарат назначают по 1 г/сут в течение 3 дней в составе комбинированной терапии. Детям Зитролид и Зитролид Форте назначают из расчета 10 мг/кг массы тела 1 раз/сут в течение 3 дней или в 1-й день - 10 мг/кг, затем в течение 4 дней - по 5-10 мг/кг/сут в течение 3 дней (курсовая доза - 30 мг/кг). При болезни Лайма (боррелиозе) для лечения начальной стадии erythema migrans детям назначают в дозе 20 мг/кг в 1-й день и по 10 мг/кг со 2-го по 5-й день. Меры предосторожности В период лечения возможно обострение псориаза. При феохромоцитоме пропранолол можно применять только после приема альфа-адреноблокатора. После продолжительного курса лечения пропранолол следует отменять постепенно, под наблюдением врача. На фоне лечения пропранололом следует избегать в/в введения верапамила , дилтиазема . За несколько дней перед проведением наркоза необходимо прекратить прием пропранолола или подобрать средство для наркоза с минимальным отрицательным инотропным действием. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами У пациентов, деятельность которых требует повышенного внимания, вопрос о применении пропранолола амбулаторно следует решать только после оценки индивидуальной реакции пациента. Побочное действие Со стороны пищеварительной системы: диарея (5%), тошнота (3%), абдоминальные боли (3%) . &#8804 .1% - диспепсия, метеоризм, рвота, мелена, холестатическая желтуха, повышение активности печеночных трансаминаз . у детей - запоры, анорексия, гастрит, изменение вкуса (&#8804 .1%). Со стороны сердечно-сосудистой системы: ощущение сердцебиения, боль в грудной клетке (&#8804 .1%). Со стороны ЦНС: головокружение, головная боль, сонливость . у детей - головная боль (при терапии среднего отита), гиперкинезия, тревожность, невроз, нарушение сна (&#8804 .1%). Со стороны мочеполовой системы: вагинальный кандидоз, нефрит (&#8804 .1%). Аллергические реакции: сыпь, фотосенсибилизация, отек Квинке . у детей (&#8804 .1%) - конъюнктивит, зуд, крапивница. Особые указания Необходимо соблюдать перерыв в 2 ч при одновременном применении антацидов. После отмены лечения реакции гиперчувствительности у некоторых пациентов могут сохраняться, что требует специфической терапии под наблюдением врача. Применение при беременности и кормлении грудью При беременности Зитролид и Зитролид Форте следует применять с осторожностью и в случаях, когда ожидаемая польза терапии для матери значительно превышает потенциальный риск для плода. Препарат противопоказан к применению в период лактации (грудного вскармливания). При необходимости применения Зитролида и Зитролида Форте в период лактации на время лечения грудное вскармливание рекомендуется приостановить. Тип: Лекарственное средство

Количество в упаковке, шт: 6 Срок годности: 36 мес Действующее вещество: Азитромицин (Azithromycin) Путь введения: Перорально Порядок отпуска: По рецепту Форма выпуска: По рецепту Условия хранения: В сухом месте, В защищенном от солнца помещении, Беречь от детей Максимальная допустимая температура хранения, °C: 25 Фармакологическая группа: J01FA Макролиды Минимальный возраст от: 3 года

Действующее вещество

Азитромицин

Состав

Азитромицин 250 мг Вспомогательные вещества: магния стеарат, целлюлоза микрокристаллическая. Состав оболочки капсул: желатин, титана диоксид, хинолиновый желтый, азорубин, понсо 4R.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные чувствительными к препарату микроорганизмами: — инфекции верхних отделов дыхательных путей и ЛОР-органов (в т.ч. ангина, фарингит, синусит, тонзиллит, средний отит) . — инфекции нижних отделов дыхательных путей (в т.ч. бактериальные и атипичные пневмонии, бронхит) . — скарлатина . — инфекции кожи и мягких тканей (в т.ч. рожа, импетиго, вторично инфицированные дерматозы) . — инфекции мочеполовой системы (в т.ч. неосложненный уретрит и/или цервицит) . — болезнь Лайма (боррелиоз) - для лечения начальной стадии (erythema migrans) . — заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки, ассоциированные с Helicobacter pylori (в составе комбинированной терапии).

Способ применения и дозы

Зитролид и Зитролид Форте принимают внутрь 1 раз/сут за 1 ч до еды или через 2 ч после приема пищи. Взрослым при инфекциях верхних и нижних отделов дыхательных путей назначают 500 мг/сут в течение 3 дней . курсовая доза составляет 1.5 г. При инфекциях кожи и мягких тканей назначают 1 г в 1-й день и по 500 мг ежедневно со 2-го по 5-й день (курсовая доза - 3 г). При острых инфекциях мочеполовой системы (неосложненный уретрит или цервицит) назначают однократно 1 г. При болезни Лайма (боррелиозе) для лечения I стадии (erythema migrans) назначают 1 г в 1-й день и по 500 мг ежедневно со 2-го по 5-й день (курсовая доза - 3 г). При язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, ассоциированной с Helicobacter pylori, препарат назначают по 1 г/сут в течение 3 дней в составе комбинированной терапии. Детям Зитролид и Зитролид Форте назначают из расчета 10 мг/кг массы тела 1 раз/сут в течение 3 дней или в 1-й день - 10 мг/кг, затем в течение 4 дней - по 5-10 мг/кг/сут в течение 3 дней (курсовая доза - 30 мг/кг). При болезни Лайма (боррелиозе) для лечения начальной стадии erythema migrans детям назначают в дозе 20 мг/кг в 1-й день и по 10 мг/кг со 2-го по 5-й день.

Противопоказания

— печеночная недостаточность тяжелой степени . — почечная недостаточность тяжелой степени . — период лактации (грудное вскармливание) . — детский возраст до 3 лет . — повышенная чувствительность к азитромицину или другим макролидам. С осторожностью применяют препарат при беременности, аритмии (возможно развитие желудочковых аритмий и удлинение интервала QT), у детей с выраженными нарушениями функции печени или почек.

Применение при беременности и кормлении грудью

При беременности Зитролид и Зитролид Форте следует применять с осторожностью и в случаях, когда ожидаемая польза терапии для матери значительно превышает потенциальный риск для плода. Препарат противопоказан к применению в период лактации (грудного вскармливания). При необходимости применения Зитролида и Зитролида Форте в период лактации на время лечения грудное вскармливание рекомендуется приостановить.

Побочные действия

Со стороны пищеварительной системы: диарея (5%), тошнота (3%), абдоминальные боли (3%) . &#8804 .1% - диспепсия, метеоризм, рвота, мелена, холестатическая желтуха, повышение активности печеночных трансаминаз . у детей - запоры, анорексия, гастрит, изменение вкуса (&#8804 .1%). Со стороны сердечно-сосудистой системы: ощущение сердцебиения, боль в грудной клетке (&#8804 .1%). Со стороны ЦНС: головокружение, головная боль, сонливость . у детей - головная боль (при терапии среднего отита), гиперкинезия, тревожность, невроз, нарушение сна (&#8804 . 1%). Со стороны мочеполовой системы: вагинальный кандидоз, нефрит (&#8804 .1%). Аллергические реакции: сыпь, фотосенсибилизация, отек Квинке . у детей (&#8804 . 1%) - конъюнктивит, зуд, крапивница.

Особые указания

Со стороны пищеварительной системы: диарея (5%), тошнота (3%), абдоминальные боли (3%) . &#8804 .1% - диспепсия, метеоризм, рвота, мелена, холестатическая желтуха, повышение активности печеночных трансаминаз . у детей - запоры, анорексия, гастрит, изменение вкуса (&#8804 .1%). Со стороны сердечно-сосудистой системы: ощущение сердцебиения, боль в грудной клетке (&#8804 .1%). Со стороны ЦНС: головокружение, головная боль, сонливость . у детей - головная боль (при терапии среднего отита), гиперкинезия, тревожность, невроз, нарушение сна (&#8804 . 1%). Со стороны мочеполовой системы: вагинальный кандидоз, нефрит (&#8804 .1%). Аллергические реакции: сыпь, фотосенсибилизация, отек Квинке . у детей (&#8804 . 1%) - конъюнктивит, зуд, крапивница.