Инструкция по применению
Золотой конек Таблетки массой 700 мг 100 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Индонезия
Производитель: ПТ.Иконг
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 100
Срок годности: 36.0



Описание

Биологически активные вещества средства "Золотой конек" (низкомолекулярные пептиды, органические цианиды и изоцианиды, морские тиоцианаты, изотиоцианаты и дихлоримины, эхинохром 2 и др.) стимулируют половую функцию, устраняют половую слабость у мужчин и фригидность у женщин, улучшают оргастические ощущения. Тритерпеновые гликозиды (панаксозиды) из женьшеня обыкновенного оказывают стимулирующее действие на ЦНС, сердечно-сосудистую, эндокринную, иммунную и кроветворную систему, улучшают клеточный метаболизм, обмен липидов и половую функцию. Гликозиды, алкалоиды и другие активные вещества из шелковочашечника курчавого обладают уролитолитическим и мочегонным действием, из кошачьего уса — антиспастическим, диуретическим и желчегонным действием, из осота короткоушкового — антибактериальным эффектом.

Состав

Активные вещества: экстракты морского конька (Hippocampus kelloggi) - 40 мг, корня женьшеня настоящего (Panax ginseng) - 40 мг, листьев осота короткоушкового (Sonchus brachyotus) - 10 мг, листьев почечного чая (Orthosiphon stamineus) - 5 мг, листьев шелковочашечника курчавого (Strobilanthus crispus) - 5 мг. Вспомогательные вещества: крахмал - 172,75 мг, лактоза - 116,65 мг, сахароза - 104,17 мг, карбонат кальция - 86,16 мг, тальк - 52,82 мг, желатин - 44,99 мг, метиленовый синий - 17,5 мг, стеарат магния - 4,17 мг, синий блестящий - 0,66 мг, бензоат натрия - 0,13 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

- Для повышения потенции, полового влечения и сексуальной выносливости, усиления полноты и яркости оргастических ощущений при сексуальных дисфункциях, половой слабости, фригидности,- Для профилактики и вспомогательной терапии мочекаменной болезни,- Для поддержания физической и умственной активности, преодоления усталости, депрессии как общеукрепляющее средство.

Способ применения и дозы

Внутрь, во время еды, запивая теплой водой, по 2 таблетке 2 раза в сутки утром и вечером, в течение 10–25 дней или за 1–4 часа до предполагаемой сексуальной активности.

Противопоказания

- гиперчувствительность,- гипертензия, нарушение функций сердца, выраженный атеросклероз,- повышенная нервная возбудимость, бессонница,- беременность,- грудное вскармливание,- детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано при беременности, кормлении грудью.

Взаимодействие с другими препаратами

Во флаконе вместе с таблетками находится пакетик с поглощающим влагу веществом, содержимое которого употреблению не подлежит.

Особые указания

После применения моча может приобретать голубой или зеленый оттенок.
Биологически активная добавка (БАД) к пище. Не является лекарственным средством.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

В сухом темном месте