Инструкция по применению
Зорекс капсулы 250 мг + 10 мг 2 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Валента Фарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Димеркаптопропансульфонат натрия+Кальция пантотенат
Количество в упаковке: 2
Дозировка действующего вещества: 250 мг+ 10 мг
Срок годности: 24.0

Действующее вещество

Димеркаптопропансульфонат натрия+Кальция пантотенат

Состав

В 1 капсуле : димеркаптопропансульфонат натрия (унитиол) 250 мг; кальция пантотенат 10 мг.Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая - 120.2 мг, лимонной кислоты моногидрат - 12.2 мг, крахмал прежелатинизированный - 40.2 мг, магния гидрофосфата тригидрат - 50 мг, повидон - 9.4 мг, кремния диоксид коллоидный - 8 мг.

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

Всасывание:После приема внутрь капсулы, содержащей 250 мг унитиола, Cmax последнего в крови достигается через 1.5 ч и составляет 90-140 мг/л. Среднее время нахождения препарата в организме - 9-11 ч (10.16±0.39 ч), в т.ч. в ЖКТ - 15-20 мин. Кальция пантотенат хорошо всасывается из кишечника и расщепляется, освобождая пантотеновую кислоту.Выведение:T1/2 составляет 7.5±0.46 ч.Около 60% препарата выводится с мочой, частично - с калом.

Показания

Алкогольный абстинентный синдром (для профилактики и лечения похмелья);— хронический алкоголизм (в составе комплексной терапии);— острые и хронические отравления органическими и неорганическими соединениями мышьяка, ртути, золота, хрома, кадмия, кобальта, меди, цинка, никеля, висмута, сурьмы, интоксикация сердечными гликозидами.

Способ применения и дозы

Препарат назначают внутрь. Капсулы следует принимать за 30 мин до приема пищи, не разжевывая, запивая водой.Для профилактики похмелья - после приема алкоголя 1 капс. (250 мг+10 мг) вечером перед сном.Для лечения алкогольного абстинентного синдрома - по 1 капс. (250 мг+10 мг) 1-2 раза/сут (дозы приведены в пересчете на унитиол и кальция пантотенат). При необходимости суточную дозу можно увеличить до 750 мг (по унитиолу), а кратность приема следует довести до 3 раз/сут. Препарат следует принимать 3-7 дней до прекращения симптомов интоксикации.При хроническом алкоголизме назначают по 1 капс. (150 мг+7 мг) 1-2 раза/сут в течение 10 дней (дозы приведены в пересчете на унитиол и кальция пантотенат).При отравлениях соединениями мышьяка и солями тяжелых металлов назначают 300-1000 мг/сут (по унитиолу), разделенные на 2-3 приема в течение 7-10 дней.

Противопоказания

Тяжелые заболевания печени в стадии декомпенсации;— тяжелые заболевания почек в стадии декомпенсации;— детский возраст до 18 лет;— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Данных о применении препарата Зорекс; при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) нет. В связи с отсутствием необходимых сведений применение при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Побочные действия

Аллергические реакции: редко - кожный зуд, крапивница, сыпь на коже и слизистых, отек слизистых, генитальный зуд, стоматит; очень редко - появление аллергической реакции по типу ангионевротического отека или синдрома Стивена-Джонсона (внезапное повышение температуры тела, недомогание, пятнисто-везикулезные или буллезные высыпания на коже, слизистых оболочках полости рта, половых органов, в области заднего прохода). В этом случае следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу. Риск развития аллергических реакций выше у лиц с бронхиальной астмой или наличием аллергии в анамнезе.При применении в высоких дозах: тошнота, головокружение, тахикардия, бледность кожных покровов.

Передозировка

Симптомы передозировки могут появиться при превышении рекомендуемой дозы более чем в 10 раз.Симптомы: одышка, гиперкинезы, заторможенность, вялость, оглушенность, кратковременные судороги.Лечение: промывание желудка, назначение активированного угля, слабительных препаратов. Проводят симптоматическую терапию, в острых случаях показана оксигенотерапия, введение декстрозы.

Взаимодействие с другими препаратами

Не совместим с лекарственными препаратами, содержащими соли тяжелых металлов, а также со щелочами (быстро разлагается).

Особые указания

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами : Препарат не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).

Условия хранения

Беречь от детей