Инструкция по применению
Зостерин Ультра Порошок 30 % 1 г пакеты 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Порошок
Страна: Россия
Производитель: Аквамир
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 10



Описание

Способствует улучшению состояния желудочно-кишечного тракта. Действие Предотвращает обострение язвенной болезни и способствует заживлению язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, улучшает пищеварение, способствует нормализации веса. Способствует восстановлению функции поджелудочной железы при остром и хроническом панкреатите. Снижает уровень холестерина в крови и предотвращает атеросклероз. Улучшает обмен веществ в организме и используется в качестве дополнительного средства при лечении сахарного диабета. Замедляет рост раковых клеток. При химиотерапии и лучевой терапии используется в качестве мощного детоксиканта. При гепатитах применяется для ускорения восстановления печени. Эффективен при лечении аллергии различного происхождения. Эффективен при профилактике простудных заболеваний и гриппа. Устраняет побочные явления, вызванные другими лекарственными препаратами (антибиотиками). Эффективен при профилактике и лечении профессиональных заболеваний - отравлений металлами, их соединениями и другими токсическими веществами.

Состав

Активные вещества: Полигалактуроновые кислоты.

Форма выпуска

Порошок

Показания

Рекомендовано в качестве: дополнительного источника растворимых пищевых волокон (зостерина-пектина с повышенной сорбционной способностью), способствует улучшению состояния желудочно-кишечного тракта и выведению чужеродных соединений из организма.

Способ применения и дозы

Для взрослых и детей от 12 лет 1 раз в день 2-3 часа после ужина в течение 10 дней Применяют внутрь в виде 0.5 % раствора (1г Зостерина - Ультра 30% растворить в 100-200 мл горячей воды или 0,5 г - Зостерина- Ультра 60% растворить в 100 мл горячей воды). Для детей от 3-х до 12-ти лет 1 раз в день в течение 10 дней 0,5 г Зостерина - Ультра 30% (1 порошок растворить в 100 мл горячей воды) или 0,25 г Зостерина - Ультра 60% (1/2 порошка растворить в 50 - 100 мл горячей воды).

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта.