Инструкция по применению
Зовиракс Крем для наружного применения 5 % 5 г

Характеристики

Форма выпуска: Крем
Страна: Великобритания
Производитель: Хелеон
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Ацикловир
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 36



Описание

Зовиракс крем — это средство для лечения простуды на губах и коже лица (рецидивирующий герпес губ) на разных стадиях развития инфекции1. Зовиракс крем проникает в клетки, пораженные вирусом герпеса 1 и 2 типа1. Способствует лечению инфекции на более поздних стадиях папулы или пузырька. Подходит для взрослых и детей с 12-ти лет. Рекомендуется применять 5 раз в день каждые 4 часа — крем наносится на поражённую зону и примыкающие к ней участки кожи. Если симптомы не проходят за 10 дней лечения, рекомендуется обратиться к врачу1. Произведён в Великобритании. Для лечения на ранней стадии эпизода герпеса губ (покалывание, краснота, припухлость) может подойти Зовиракс Дуо-Актив2. 1. Инструкция по медицинскому применению препарата Зовиракс крем, РУ П N014304/01 от 25.12.2007 2. Инструкция по медицинскому применению препарата Зовиракс Дуо-Актив. РУ ЛП-001674 от 28.02.2018

Действующее вещество

Ацикловир

Состав

100 г крема содержит: Активного вещества: Ацикловир Вспомогательные вещества: полоксамер 407 - 1 г, цетостеариловый спирт - 6.75 г, парафин белый мягкий - 11.5 г, натрия лаурилсульфат - 0.75 мг, парафин жидкий - 5 г, глицерол моностеарат - 0.75 г, макрогола стеарат - 0.75 г, пропиленгликоль - 40 г, диметикон - 1 г, вода очищенная - до 100 г.

Форма выпуска

Крем

Фармакокинетика

При повторном применении крема системная абсорбция минимальная.

Показания

Инфекции кожи и слизистых оболочек, вызванные вирусом Herpes simplex типов 1 и 2, в т.ч. герпес губ.

Способ применения и дозы

Препарат рекомендуется наносить 5 раз/сут (примерно каждые 4 ч) тонким слоем на пораженные и граничащие с ними участки кожи и слизистых оболочек. Длительность лечения - не менее 4 дней. В случае отсутствия заживления лечение может быть продолжено до 10 дней. В случае сохранения симптомов заболевания более 10 дней, следует проконсультироваться с врачом. Крем наносят либо ватным тампоном, либо чистыми руками, чтобы избежать дополнительного инфицирования пораженных участков.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к ацикловиру и другим компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Адекватных и строго контролируемых клинических исследований безопасности применения препарата при беременности не проводилось. Применение показано только в тех случаях, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Побочные действия

Местные реакции: иногда - кратковременные покраснение, зуд, шелушение, жжение или покалывание на участках нанесения препарата. Аллергические реакции: редко - аллергический дерматит (чаще связанный с реакцией на вспомогательные вещества), в единичных случаях - отек Квинке.

Передозировка

Данных о передозировке препарата Зовиракс® нет.

Взаимодействие с другими препаратами

Взаимодействия препарата Зовиракс® с другими лекарственными средствами не выявлено.

Особые указания

Для достижения максимального терапевтического эффекта необходимо применять препарат уже при первых признаках заболевания (жжение, зуд, покалывание, ощущение напряженности и покраснение). При выраженных проявлениях герпеса губ рекомендуется проконсультироваться с врачом. Крем не рекомендуется наносить на слизистые оболочки полости рта и глаз, т.к. возможно развитие местного воспаления. При лечении генитального герпеса рекомендуется избегать половых контактов или использовать презервативы, т.к. применение ацикловира не предупреждает передачу вируса половым путем. Пациенты с иммунодефицитом при лечении любых инфекционных заболеваний должны следовать рекомендациям врача.

Условия хранения

Не допускать замерзания