Инструкция по применению
Зверобой с Травами 50 г

Характеристики

Форма выпуска: Трава измельченная
Страна: Россия
Производитель: Фармгрупп
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Лекарственная формаРазличной формы кусочки стеблей, листьев, цветков, недозрелые плоды и их части. Цвет от серовато- или желтовато-зеленого до темно-зеленого, с зеленовато-желтыми, желтыми, зеленовато-коричневыми, редко – розовато-фиолетовыми и коричневыми вкраплениями. Запах слабый, своеобразный. Вкус водного извлечения горьковатый, слегка вяжущий.Зверобой часто используют в стоматологии – как отдельно, так и в составе комбинированных средств. Настой этой лекарственной травы назначают в виде полосканий при воспалениях десен и слизистых полости рта — во время лечения гингивита, стоматита и прочих заболеваний. Помимо дубильных веществ настой зверобоя содержит и другие ценные элементы: эфирное масло, витамины С и Е, флавоноиды — все это способствует восстановлению мягких тканей. Внутрь настой зверобоя принимают при колите — его вяжущие и противовоспалительные свойства помогают в лечении слизистых оболочек стенок кишечника.

Состав

Зверобой продырявленный (трава), ноготки лекарственные (цветки), крапива двудомная (листья).

Форма выпуска

Трава измельченная

Показания

Колиты, гингивиты, стоматиты.

Способ применения и дозы

1 чайную ложку (2,0 г), либо 1 фильтр-пакет (1,5-2,0 г) залить 1 стаканом (200 мл) горячей воды, настоять 15 минут, процедить, принимать взрослым по ½ стакана (100 мл) 1 раз в день во время еды. Готовый настой хранить в холодильнике. Продолжительность приема – 1 месяц.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано применение при беременности и в период лактации.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции. В некоторых случаях при приеме внутрь – фотосенсибилизирующее действие (повышенная чувствительность кожи к действию солнечного света), при длительном применении настой может вызвать неприятные ощущения в области печени (в правом подреберье) и ощущение горечи во рту.

Взаимодействие с другими препаратами

При совместном применении настоя с противовирусными средствами – ингибиторами протеазы ВИЧ (ампренавир, индинавир, нелфинавир, ритонавир, саквинавир), стероидными препаратами, а также препаратами циклоспорином, варфарином - возможно снижение эффективности этих препаратов. Препарат способен усиливать фотосенсибилизирующее действие других лекарственных средств, в т.ч. тетрациклинов, сульфаниламидов, тиазидных диуретиков, хинолонов, пироксикама. Препарат следует с осторожностью применять при использовании дигоксина.

Особые указания

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременным и кормящим женщинам