Инструкция по применению
Зверобой Иван-чай Трава 50 г

Характеристики



Форма выпуска: Трава измельченная
Страна: Россия
Производитель: Иван-Чай
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Зверобоя продырявленного трава
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 36

Описание

Кусочки стеблей, листьев (серовато-зеленого цвета), цветков (желтого цвета) различной формы и недозрелых плодов, проходящих сквозь сито с отверстиями размером 7 мм. Запах слабый. Вкус водного извлечения горьковатый, слегка вяжущий. Трава зверобоя содержит дубильные вещества, эфирное масло, тритерпеновые сапонины, витамины С и Е, флавоноиды, антрахиноны, макро- и микроэлементы и другие биологические активные вещества.

Действующее вещество

Зверобоя продырявленного трава

Состав

Зверобоя трава

Форма выпуска

Трава измельченная

Показания

Воспалительные заболевания слизистой оболочки полости рта (в т.ч. гингивит, стоматит); хронический колит (в составе комплексной терапии).

Способ применения и дозы

Около 10 г (1 столовая ложка) травы зверобоя помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, закрывают крышкой, нагревают на кипящей водяной бане при периодическом помешивании в течение 15 минут, охлаждают при комнатной температуре 45 минут, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл. Принимают внутрь в теплом виде по 1/2 стакана 2 раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения 2-3 недели. Для полосканий применяют по 1/2 стакана теплого настоя 3-4 раза в день. Курс лечения 5-10 дней. Перед применением настой рекомендуется взбалтывать.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату, детский возраст до 12 лет. При приеме внутрь - беременность, период лактации.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции. При приеме внутрь - фотосенсибилизирующее действие (повышенная чувствительность кожи к действию солнечного света), при длительном применении может вызвать неприятные ощущения в области печени (в правом подреберье) и чувство горечи во рту.

Взаимодействие с другими препаратами

При совместном применении препаратов зверобоя с циклоспорином, варфарином, дигоксином, стероидными препаратами, противовирусными средствами - ингибиторами протеазы ВИЧ (ампренавир, индинавир, нелфинавир, ритонавир, саквинавир) возможно снижение их активности. Препарат способен усиливать фотосенсибилизирующее действие других лекарственных средств, в т.ч. тетрациклинов, сульфаниламидов, тиазидных диуретиков, хинолонов, пироксикама. Особые указания Во время лечения следует воздержаться от длительного пребывания на солнце, от посещения солярия.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте; приготовленный настой - в прохладном месте не более 2-х суток. Хранить в недоступном для детей месте.